

البكالوريا بين يديك

BAC

محمد صابور

المتتاليات العددية

100 تمرين تطبيقي

البر فامج الجديد

محمد صابور

المتتاليات العددية

100 تمرين تطبيقي

البرنامج الجديد

الشعب : علوم تجريبية - رياضيات - تقني رياضي

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف
المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .
أما بعد أخي القارئ أقدم إليك كتابا جديدا عنوانه
المتتاليات العددية يضاف في سلسلة البكالوريا بين يديك .
يحتوي هذا الكتاب 100 تمرين تطبيقي منها المحلولة حلا
مفصلا ومنها المرفقة بالنتائج فقط وأخرى مقترحة للحل كي
يختبر بها الطالب المعلومات التي اكتسبها في هذا المحور .
وأخيرا أتمنى لكل القراء من طلبتنا الأعزاء التوفيق كما أرجو
من زملائي أساتذة الرياضيات أن يمدوني بملاحظاتهم البناءة
لتحسين محتوى هذا الكتيب .
كما أشكر شكرا جزيلا كل من ساهم من بعيد أو قريب في
انجاز هذا العمل المتواضع .

محمد صابور

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

رقم الإيداع القانوني : 2007 - 3376

ردمك ISBN : 978-9947-0-1865-1

طبع بمطبعة ع - بن برج الكيفان (الجزائر)

Scanned by: Mekkaoui Ayoub
Email: ayoubsoft2011@hotmail.fr

المتتاليات العددية

المتتالية العددية

تعريف : نسمي متتالية عددية كل دالة من مجموعة الأعداد الطبيعية \mathbb{N} في مجموعة الأعداد الحقيقية \mathbb{R}
نرمز إلى المتتالية العددية بـ : $(u_n), (v_n), (s_n), \dots$
الأعداد الحقيقية u_0, u_1, \dots, u_n تسمى حدود المتتالية العددية (u_n)
العدد الحقيقي u_n يسمى الحد العام للمتتالية (u_n)

التمثيل البياني لمتتالية عددية

(u_n) متتالية عددية معرفة بحددها الأول u_0 والعلاقة التراجعية
 $u_{n+1} = f(u_n)$ حيث f هي دالة معرفة على \mathbb{N} .
مجموعة النقاط $(u_n; f(u_n))$ هي التمثيل البياني في المستوي
المنسوب إلى معلم للمتتالية (u_n) .

المتتاليات الحسابية

تعريف : نقول بأن المتتالية (u_n) هي متتالية حسابية إذا
و فقط وجد عدد حقيقي r بحيث أن من أجل كل عدد
طبيعي \mathbb{N} فإن : $u_{n+1} = u_n + r$.
يسمى العدد الحقيقي r أساس المتتالية (u_n)

الإهداء

أهدي هذا العمل المتواضع إلى :

- والدي الكريمين
- رجال التعليم المخلصين في عملهم
- أبنائي الطلبة متمنيا لهم التوفيق في

شهادة البكالوريا

الأستاذ: محمد صابور

الحد العام لمتتالية حسابية

(u_n) متتالية حسابية أساسها r وحدها العام u_n .

- إذا كان u_0 هو الحد الأول فإن : $u_n = u_0 + nr$

- إذا كان u_1 هو الحد الأول فإن : $u_n = u_1 + (n-1)r$

مجموع حدود متتالية حسابية

(u_n) متتالية حسابية حدها الأول u_0 فإن من أجل كل عدد

$$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n = (u_0 + u_n) \times \left(\frac{n+1}{2} \right) : \mathbb{N} \text{ طبيعي}$$

S_n يساوي عدد الحدود مضروب في نصف مجموع الحد الأول والحد الأخير.

الوسط الحسابي

إذا كان a, b, c ثلاثة حدود متتالية حسابية فإن :

$$a + c = 2b \text{ أي } a + b + c = 3b$$

المتتاليات الهندسية

تعريف : نقول بأن المتتالية (u_n) هي متتالية هندسية إذا

و فقط وجد عدد حقيقي q بحيث أن من أجل كل عدد طبيعي n

$$u_{n+1} = u_n \times q$$

الحد العام لمتتالية هندسية

(u_n) متتالية هندسية أساسها q . - إذا كان الحد الأول

هو u_0 فإن عبارة الحد العام هي : $u_n = u_0 \times q^n$

- إذا كان الحد الأول هو u_1 فإن عبارة الحد العام هي :

$$u_n = u_1 \times q^{n-1}$$

مجموع حدود متتالية هندسية

(u_n) متتالية هندسية حدها الأول u_0 وأساسها q حيث $q \neq 1$

فإن من أجل كل عدد طبيعي n فإن :

$$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = u_0 \times \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}$$

الوسط الهندسي

إذا كان a, b, c بهذا الترتيب تمثل ثلاثة حدود متتالية

لمتتالية هندسية فإن : $a \times c = b^2$ أي : $a \times b \times c = b^3$

المتتاليات المتقاربة والمتباعدة

تكون المتتالية (u_n) متقاربة إذا كان $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lambda$ ($\lambda \in \mathbb{R}$)

تكون المتتالية (u_n) متباعدة إذا كانت ليست متقاربة

ملاحظة : - إذا كانت متتالية عددية متزايدة ومحدودة من

الأعلى (majorée) فهي متقاربة .

- إذا كانت متتالية عددية متناقصة ومحدودة من

الأسفل (minorée) فهي متقاربة .

نهاية متتالية هندسية

(u_n) متتالية هندسية أساسها q . - إذا كان $q > 1$ فإن :

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \pm \infty$ وتكون المتتالية (u_n) متباعدة .

تمارين محلولة

تمرين 1

u_1, u_2, u_3 ثلاثة حدود لمتتالية حسابية حيث :
 $u_1 + u_2 + u_3 = 36$ و $u_1 \times u_2 \times u_3 = 1428$

عين u_1, u_2, u_3

الحل

$$\begin{cases} 3u_2 = 36 \\ u_1 \times u_2 \times u_3 = 1428 \end{cases} \text{ يكافئ } \begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 = 36 \\ u_1 \times u_2 \times u_3 = 1428 \end{cases}$$

ومنه $u_2 = 12$ وبتعويض قيمة u_2 في الجملة السابقة نجد :

$$\begin{cases} u_3 = 24 - u_1 \\ u_1^2 - 24u_1 + 119 = 0 \end{cases} \text{ يكافئ } \begin{cases} u_1 + u_3 = 24 \\ u_1 \times u_3 = 119 \end{cases}$$


ومنه $(u_1 = 17, u_3 = 7)$ أو $(u_1 = 7, u_3 = 17)$ إذن :
 $(u_1 = 17, u_2 = 12, u_3 = 7)$ أو $(u_1 = 7, u_2 = 12, u_3 = 17)$

تمرين 2

(u_n) متتالية حسابية حدها الأول u_0 وأساسها r و S_n هو مجموع
 n حدا الأولى من هذه المتتالية .

- (1) أحسب r و S_{15} علما أن : $u_0 = -3$ و $u_{14} = 25$
- (2) أحسب r و n علما أن : $u_0 = 2$ و $u_{n-1} = -15$ و $S_n = -117$

- إذا كان $-1 < q < 1$ فإن $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ وتكون المتتالية
متقاربة . - إذا كان $q < -1$ تكون (u_n) متباعدة .



(3) أحسب u_0 و r علما أن $u_{n-1} = 39$ و $n = 20$ و $S_n = 400$

الحل

$$S_{15} = (u_0 + u_{14}) \times \frac{15}{2} = 22 \times \frac{15}{2} = 165 \quad (1)$$

نعلم أن: $u_{14} = u_0 + 14r$ ومنه $25 = -3 + 14r$ ومنه $r = 2$

$$S_n = u_0 + \dots + u_{n-1} = (u_0 + u_{n-1}) \times \frac{n}{2} = -117 \quad (2)$$

$$\text{ومنه : } -13 \times \frac{n}{2} = -117 \quad \text{ومنه : } n = 117 \times \frac{2}{13} = 18$$

$$r = -1 \quad \text{ومنه : } u_{n-1} = u_{17} = u_0 + 17r = 2 + 17r = -15$$

$$S_n = S_{20} = (u_0 + u_{19}) \times \frac{20}{2} = (u_0 + 39) \times 10 = 400 \quad (3)$$

$$\text{ومنه : } u_0 + 39 = 40 \quad \text{ومنه : } u_0 = 1$$

$$\text{لدينا : } u_{19} = u_0 + 19r = 1 + 19r = 39 \quad \text{ومنه : } r = 2$$

تمرين 3

c, b, a بهذا الترتيب هي ثلاثة حدود متتابعة لمتتالية حسابية مجموعها 333 ومجموع مربعاتها 37205. عين الأعداد c, b, a

الحل

c, b, a حدود متتابعة لمتتالية حسابية يعني : $2b = a + c$

$$\text{ومنه : } a + b + c = 3b = 333 \quad \text{ومنه : } b = 111$$

$$\text{نعلم أن : } a = b - r \quad \text{و } c = b + r \quad \text{و } a^2 + b^2 + c^2 = 37205$$

$$\text{ومنه : } (b-r)^2 + b^2 + (b+r)^2 = 3b^2 + 2r^2 = 37205$$

بما أن $b = 111$ فإن : $2r^2 = 242$ ومنه : $r = -11$ أو $r = 11$

إذا كان $r = 11$ فإن $a = b - r = 100$ و $c = b + r = 122$

إذا كان $r = -11$ فإن $a = b - r = 122$ و $c = b + r = 100$

تمرين 4

عين الأعداد الحقيقية c, b, a حيث $a + b + c = \frac{19}{2}$

والأعداد $2a, b, (c-5)$ بهذا الترتيب هي حدود متتابعة لمتتالية

حسابية مجموعها يساوي 9

الحل

$(c-5), b, 2a$ حدود متتابعة لمتتالية حسابية يعني :

$$2b = 2a + (c-5) \quad \text{ومنه } 2b = 2a + (c-5) \quad \text{ومنه } 2a + b + c - 5 = 3b = 9$$

$$\begin{cases} a + c = \frac{13}{2} \\ 2a + c = 11 \end{cases} \quad \text{وبتعويض } b = 3 \text{ في المعادلات السابقة نجد :}$$

$$\text{ومنه : } a = 9/2 \quad \text{و } c = 2$$

إذن الأعداد الحقيقية المطلوبة هي : $a = 9/2, b = 3, c = 2$

تمرين 5

(u_n) متتالية عددية معرفة على \mathbb{N} بالعلاقة : $u_{n+1} = 4n + 1$

(1) بين أن (u_n) متتالية حسابية وعين أساسها r وحدها الأول u_1

(2) هل العدد 2001 هو حد من حدود هذه المتتالية ؟

(3) ما قيمة ورتبة الحد الذي نبدأ منه حتى يكون مجموع 20 حدًا متتابعًا من هذه المتتالية مساويًا 1100.

(4) أحسب الجداء : $2^1 \times 2^5 \times 2^9 \times \dots \times 2^{4n+1}$

الحل

$$(1) \quad u_{n+1} - u_n = (4n+1) - [4(n-1)+1] = 4 \quad \text{إذن } (u_n)$$

متتالية حسابية حدها الأول $u_1 = 4 \times 0 + 1 = 1$ وأساسها $r = 4$

(2) نعلم أن $u_{n+1} = 4n+1$ ، إذن يكون العدد 2001 حد من حدود

المتتالية (u_n) إذا وجد عدد طبيعي n بحيث : $2001 = 4n+1$

نلاحظ أن $n = 500$ لأن : $2001 = 4 \times 500 + 1$.

إذن 2001 هو حد من حدود المتتالية (u_n)

(3) لنرمز بـ u_p للحد الأول الذي نبدأ منه ويكون الحد العشرين u_{p+19}

$$\text{نعلم أن } u_p + u_{p+1} + \dots + u_{p+19} = (u_p + u_{p+19}) \times \frac{20}{2} = 1100$$

$$\text{لدينا : } u_p = u_1 + (p-1) \times r = 1 + 4(p-1) = 4p - 3$$

$$u_{p+19} = u_1 + (p+19-1) \times r = 1 + 4(p+18) = 4p + 73$$

$$(u_p + u_{p+19}) \times 10 = 1100 \quad \text{ومنه } 8p + 70 = 110 \quad \text{أي } p = 5$$

إذن الحد الأول الذي نبدأ منه هو u_5 وقيمته هي :

$$u_5 = 1 + 4 \times 4 = 17$$

$$(4) \quad 2^1 \times 2^5 \times \dots \times 2^{4n+1} = 2^{1+5+\dots+(4n+1)} = 2^{(2n+1)(n+1)}$$

لأن $1 + 5 + \dots + (4n+1)$ يمثل مجموع $(n+1)$ حد لمتتالية

حسابية حدها الأول 1 وحدها الأخير $4n+1$

ونعلم أن : $1 + 5 + \dots + (4n+1) = (2n+1)(n+1)$

تمرين 6

نعتبر المتتالية الهندسية (u_n) المعرفة على \mathbb{N} بحدها الأول u_0

وأساسها q بحيث : $8u_6 = 125u_9$ ($u_6 \neq 0$) . 1) أحسب q

2) أحسب بدلالة u_0 و n المجموع $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

3) عين u_0 بحيث $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 150$.

4) نفرض أن $u_0 = 90$. عين أصغر قيمة العدد الطبيعي p حيث

من أجل كل عدد طبيعي n أكبر أو يسوي p يكون لدينا :

$$n \geq p : u_n \leq 10^{-3}$$

الحل

$$(1) \quad 8u_6 = 125u_9 \quad \text{ومنه } 8u_0 \times q^6 = 125u_0 \times q^9 \quad \text{ومنه}$$

$$q^3 = \frac{8}{125} = \left(\frac{2}{5}\right)^3 \quad \text{يعني أن : } q = \frac{2}{5}$$

$$(2) \quad S_n = u_0 + \dots + u_n = u_0 \frac{1 - \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1}}{1 - \frac{2}{5}} = \frac{5}{3} u_0 \left[1 - \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1} \right]$$

$$(3) \text{ لدينا : } \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5}{3} u_0 \left[1 - \left(\frac{2}{5} \right)^{n+1} \right] = 150$$

$$\text{ونعلم أن } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{5} \right)^{n+1} = 0 \text{ ومنه } \frac{5}{3} u_0 = 150 \text{ ومنه } u_0 = 90$$

$$(4) \quad u_n = u_0 \times q^n = 90 \times \left(\frac{2}{5} \right)^n \quad \text{بإعطاء القيم 1، 2، 3، ... إلى العدد الطبيعي } n \text{ نجد :}$$

$$u_1 = 36, u_2 = 14,4, u_3 = 5,76, \dots, u_{12} = 0,0015$$

$$u_{13} = 0,0006$$

نلاحظ أنه ابتداء من u_{13} تكون الحدود أقل من 10^{-3} أي: $u_n \leq 10^{-3}$

إذن أصغر قيمة العدد الطبيعي p هي $p = 13$.

يمكن استعمال اللوغارتم للوصول إلى هذه النتيجة.

تمرين 7

u_1, u_2, u_3, u_4, u_5 خمسة حدود لمتتالية هندسية. عين هذه الحدود

$$\text{علما أن : } u_3 > 0 \text{ و } u_1 \times u_5 = 81 \text{ و } u_2 + u_3 + u_4 = 39$$

الحل

$$u_1 \times u_5 = u_1 \times u_1 \times q^4 = (u_1 \times q^2)^2 = (u_3)^2 = 81$$

$$\text{ومنه } u_3 = 9 \text{ لأن } u_3 > 0. \text{ نعلم أن } u_4 = u_3 \times q \text{ ; } u_2 = \frac{u_3}{q}$$

$$\text{لدينا } u_2 + u_3 + u_4 = 39 \text{ ومنه : } u_2 + u_4 = \frac{9}{q} + 9q = 30$$

$$\text{ومنه : } \frac{3}{q} + 3q = 10 \text{ ومنه : } 3q^2 - 10q + 3 = 0$$

$$\text{ومنه } q = 3 \text{ أو } q = 1/3. \text{ إذا كان } q = 3 \text{ فإن :}$$

$$u_1 = 1, u_2 = 3, u_3 = 9, u_4 = 27, u_5 = 81$$

$$\text{إذا كان } q = 1/3 \text{ فإن :}$$

$$u_1 = 81, u_2 = 27, u_3 = 9, u_4 = 3, u_5 = 1$$

تمرين 8

a, b, c ثلاثة حدود متتابعة من متتالية هندسية حيث

مجموعها 63 و جداولها 1728. عين هذه الحدود

الحل

$$a, b, c \text{ ثلاثة حدود متتابعة لمتتالية هندسية يعني : } a \times c = b^2$$

$$\text{ومنه } a \times b \times c = b^3 = 1728 \text{ ومنه : } b^3 = 12^3 \text{ إذن : } b = 12$$

وبتعويض $b = 12$ في ما سبق نجد :

$$\begin{cases} a = 51 - c \\ c^2 - 51c + 144 = 0 \end{cases} \text{ يكافئ } \begin{cases} a \times c = 144 \\ a + c = 51 \end{cases}$$

$$\text{ومنه } (c = 3, a = 48) \text{ أو } (c = 48, a = 3)$$

إذن الأعداد a, b, c المطلوبة هي :

$$(c = 3, b = 12, a = 48) \text{ أو } (c = 48, b = 12, a = 3)$$

تمرين 9

u_1, u_2, u_3 ثلاثة حدود متتابعة من متتالية هندسية موجبة حيث

$$u_1 + u_2 + u_3 = 7 \text{ و } \frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2} + \frac{1}{u_3} = \frac{7}{4} \text{ . أحسب } u_1, u_2, u_3$$

الحل

$$u_1 + u_2 + u_3 = u_1 + u_1 q + u_1 q^2 = u_1 (1 + q + q^2) = 7 \quad (*)$$

$$\frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2} + \frac{1}{u_3} = \frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_1 q} + \frac{1}{u_1 q^2} = \frac{q^2 + q + 1}{u_1 q^2} = \frac{7}{4} \quad (**)$$

بتقسيم (*) على (**) نجد $u_1^2 \times q^2 = (u_1 \times q)^2 = (u_2)^2 = 4$ ومنه $u_2 = 2$ (لأن حدود المتتالية موجبة).

بتعويض u_2 في ما سبق نجد :

$$\begin{cases} u_1 + u_3 = 5 \\ u_1 \times u_3 = 4 \end{cases} \text{ ومنه } \begin{cases} u_1 + u_3 = 5 \\ \frac{u_1 + u_3}{u_1 \times u_3} = \frac{5}{4} \end{cases} \text{ ومنه } \begin{cases} u_1 + u_3 = 5 \\ \frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_3} = \frac{5}{4} \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_1 = 5 - u_3 \\ u_3 = 4 \vee u_3 = 1 \end{cases} \text{ ومنه } \begin{cases} u_1 = 5 - u_3 \\ u_3^2 - 5u_3 + 4 = 0 \end{cases}$$

إذا كان $u_3 = 4$ فإن $u_1 = 1$ وإذا كان $u_3 = 1$ فإن $u_1 = 4$

إذن $(u_1 = 1, u_2 = 2, u_3 = 4)$ أو $(u_1 = 4, u_2 = 2, u_3 = 1)$

تمرين 10

عين الأعداد الحقيقية c, b, a التي تحقق الشروط الآتية :

- a, b, c بهذا الترتيب هي ثلاثة حدود متتابعة لمتتالية حسابية
- a, b, c بهذا الترتيب هي ثلاثة حدود متتابعة لمتتالية هندسية
- $a + b + c = 30$

الحل

a, b, c حدود متتابعة لمتتالية حسابية يعني $a + c = 2b$ ومنه :

$$a + b + c = 3b = 30 \text{ ومنه } b = 10$$

a, b, c حدود متتابعة لمتتالية هندسية يعني $c^2 = ab$

وبتعويض $b = 10$ في ما سبق نجد $a + c = 20$ و $c^2 = 10a$

$$\text{ومنه : } \left(a = \frac{c^2}{10} \text{ و } \frac{c^2}{10} + c = 20 \right)$$

$$\text{ومنه : } \left(a = \frac{c^2}{10} \text{ و } c^2 + 10c - 200 = 0 \right)$$

ومنه $c = 10$ أو $c = -20$. إذن الأعداد a, b, c المطلوبة هي :

$$(a = 10, b = 10, c = 10) \text{ أو } (a = 40, b = 10, c = -20)$$

تمرين 11

a, b, c بهذا الترتيب تمثل حدود متتابعة لمتتالية هندسية حيث :

$$a + b + c = 312 \text{ و } c - a = 192 \text{ . عين } a, b, c$$

الحل

$$a + b + c = a + aq + aq^2 = a(1 + q + q^2) = 312 \quad (*)$$

$$c - a = aq^2 - a = a(q^2 - 1) = 192 \quad (**)$$

$$\text{بتقسيم (*) على (**) نجد : } \frac{q^2 + q + 1}{q^2 - 1} = \frac{312}{192} = \frac{13}{8}$$

ومنه $5q^2 - 8q - 21 = 0$ ومنه $8(1 + q^2 + q) = 13(q^2 - 1)$
ومنه $q = 3$ أو $q = -\frac{7}{5}$. إذا كان $q = 3$ ، من المعادلة (*) نجد:

$$c = bq = 216, b = aq = 24 \times 3 = 72, a = \frac{312}{13} = 24$$

$$\frac{24}{25}a = 192 \quad \text{نجد: (**) من المعادلة } q = -\frac{7}{5} \text{ إذا كان}$$

$$\text{ومنه } a = 200 \text{ و } b = aq = -280 \text{ و } c = bq = 392.$$

تمرين 12

(u_n) متتالية هندسية معرفة على \mathbb{N} أساسها q حيث $0 < q < 1$

$$\begin{cases} u_2 \times u_3 \times u_4 = 64 \\ u_2^2 + u_3^2 + u_4^2 = \frac{1456}{9} \end{cases} \quad \text{عين الحد العام } u_n \text{ علما أن:}$$

الحل

$$u_3^2 = u_2 \times u_4 \text{ ومنه } u_2 \times u_3 \times u_4 = u_3^3 = 4^3 \text{ ومنه } u_3 = 4$$

نعلم أن: $u_2 = u_3 \div q$ و $u_4 = u_3 \times q$

$$\text{ومنه: } u_2^2 + u_3^2 + u_4^2 = u_3^2 \left(\frac{1}{q^2} + q^2 + 1 \right) = \frac{1456}{9}$$

$$\text{ومنه: } 16 \left(\frac{q^4 + q^2 + 1}{q^2} \right) = \frac{1456}{9}$$

$$\frac{q^4 + q^2 + 1}{q^2} = \frac{91}{9} \text{ ومنه: } 9q^4 - 82q^2 + 9 = 0$$

$$\text{بوضع } q^2 = x \text{ نحصل على المعادلة: } 9x^2 - 82x + 9 = 0$$

وحلولها هي: $x_1 = 9$ أو $x_2 = 1/9$

$$\text{بما أن } 0 < q < 1 \text{ و } q^2 = x \text{ فإن } q = \sqrt{\frac{1}{9}} = \frac{1}{3}$$

$$\text{لدينا: } u_3 = u_0 q^3 = u_0 \times \left(\frac{1}{3} \right)^3 = 4 \text{ ومنه: } u_0 = 4 \times 27 = 108$$

$$\text{إذن: } u_n = u_0 \times q^n = 108 \times \left(\frac{1}{3} \right)^n$$

تمرين 13

$$\begin{cases} u_0 \times u_2 = 3u_1 \\ u_0 + u_1 + u_2 = 13 \end{cases} \quad (u_n) \text{ متتالية هندسية معرفة على } \mathbb{N} \text{ حيث:}$$

$$(1) \text{ أحسب } u_2, u_1, u_0$$

$$(2) \text{ أحسب الحد العام } u_n \text{ بدلالة } n \text{ للمتتالية الهندسية المتزايدة.}$$

الحل

$$\text{نعلم أن } u_0 \times u_2 = u_1^2 \text{ (الوسط الهندسي) ولدينا } u_0 \times u_2 = 3u_1$$

$$\text{ومنه: } u_1^2 = 3u_1 \text{ ومنه: } u_1 = 3 \text{ و } u_0 + u_2 = 10$$

نعلم أن $u_0 = \frac{u_1}{q}$ و $u_2 = u_1 q$ ومنه : $\frac{3}{q} + 3q = 10$

ومنه : $3q^2 - 10q + 3 = 0$ ومنه : $q = 3$ أو $q = 1/3$.

إذا كان $q = 3$ فإن : $u_0 = u_1 \div q = 1, u_1 = 3, u_2 = u_1 q = 9$

إذا كان $q = 1/3$ فإن : $u_0 = u_1 \div q = 9, u_1 = 3, u_2 = 1$

إذا كان $q = 3$ فالمتتالية (u_n) متزايدة ويكون حدها العام :

$$u_n = u_0 \times q^n = 3^n$$

تمرين 14

عين العددين الحقيقيين الموجبين a, b حيث :

- $a, (6a - b), (a + 2b)$ هي حدود متتابعة لمتتالية حسابية.

- $a, (b + 1), (4b - a)$ هي حدود متتابعة لمتتالية هندسية.

الحل

$a, (6a - b), (a + 2b)$ حدود متتابعة لمتتالية حسابية يعني أن :

$$a + (a + 2b) = 2(6a - b) \quad \text{ومنه : } 5a = 2b (*)$$

$a, (b + 1), (4b - a)$ حدود متتابعة لمتتالية هندسية يعني أن :

$$(b + 1)^2 = a(4b - a) (**)$$

من المعادلة (*) نجد : $b = \frac{5a}{2}$ وبالتعويض في (**) وبعد النشر

$$11a^2 - 20a - 4 = 0 \quad \text{والتبسيط للمعادلة نجد :}$$

وجذور هذه المعادلة هي : $a = 2$ أو $a = -\frac{2}{11}$ (مرفوض)

$$\text{إذن : } a = 2 \text{ و } b = \frac{5a}{2} = 5$$

تمرين 15

(u_n) متتالية هندسية موجبة ومتزايدة ، حدها الأول u_1 وأساسها q .

(1) عين الحدود u_1, u_2, u_3, u_4 علما أن :

$$u_1 \times u_2 \times u_3 \times u_4 = 64 \quad \text{و} \quad u_2 + u_3 = 6$$

(2) أحسب u_n بدلالة n . هل (u_n) متقاربة ؟

الحل

(1) u_1, u_2, u_3, u_4 حدود متتالية هندسية فإن $u_1 \times u_4 = u_2 \times u_3$

$$\text{ومنه : } u_1 \times u_2 \times u_3 \times u_4 = (u_2 \times u_3)^2 = 64 = 8^2$$

ومنه $u_2 \times u_3 = 8$ (لأن $u_2 > 0$ و $u_3 > 0$). لدينا :

$$\begin{cases} u_2 + u_3 = 6 \\ u_2 \times u_3 = 8 \end{cases} \quad \text{ومنه : } \begin{cases} u_3 = 6 - u_2 \\ u_2^2 - 6u_2 + 8 = 0 \end{cases}$$

ومنه : $u_2 = 2$ أو $u_2 = 4$ و $u_3 = 6 - u_2$.

إذا كان $u_2 = 2$ فإن $u_3 = 6 - u_2 = 4$ (u_n) متزايدة .

إذا كان $u_2 = 4$ فإن $u_3 = 6 - 4 = 2$ (u_n) متناقصة (مرفوضة)

ويكون q أساس المتتالية (u_n) المتزايدة يساوي : $q = u_3 \div u_2 = 2$

إذن : $u_1 = u_2 \div q = 1$ و $u_4 = u_3 \times q = 8$

(2) $u_n = u_1 q^{n-1} = 2^{n-1}$ لدينا $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ إذن (u_n) متباعدة

تمرين 16

(1) أثبت أنه إذا كان x, y, z ثلاثة أعداد حقيقية وحدود متتالية

$$x^2 + y^2 + z^2 = (x + y + z)(x - y + z)$$

(2) عين ثلاثة حدود متتالية من متتالية هندسية علما أن مجموعها 42 و مجموع مربعاتها 1092 .

الحل

(1) x, y, z حدود متتالية لمتتالية هندسية يعني $y^2 = x \times z$

$$(x + y + z)(x - y + z) = x^2 + 2xz - y^2 + z^2 =$$

$$x^2 + 2y^2 - y^2 + z^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

(2) لدينا $x + y + z = 42$ و $x^2 + y^2 + z^2 = 1092$

$$x^2 + y^2 + z^2 = (x + y + z)(x - y + z) = 42(x - y + z)$$

ومنه $x - y + z = 1092 \div 42 = 26$ ومنه :

$$(x + y + z) - (x - y + z) = 2y = 16$$

ومنه : $y = 8$. لدينا : $x + y + z = 42$ ومنه : $x + z = 34$

ونعلم أن $x = \frac{y}{q}$ و $z = yq$. وبتعويض في المعادلة السابقة

$$x + z = \frac{y}{q} + yq = 8 \left(\frac{1}{q} + q \right) = 8 \left(\frac{q^2 + 1}{q} \right) = 34 \quad \text{نجد :}$$

$$\text{ومنه : } \frac{q^2 + 1}{q} = \frac{17}{4} \quad \text{ومنه : } 4q^2 - 17q + 4 = 0$$

ومنه : $q = 4$ او $q = 1/4$

إذا كان $q = 4$ فإن $x = 2, y = 8, z = 32$

إذا كان $q = \frac{1}{4}$ فإن $x = 32, y = 8, z = 2$

تمرين 17

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ متتالية عددية حدودها موجبة معرفة كما يلي :

الخمس الحدود الأولى تشكل متتالية حسابية حدها الأول $u_1 = 1$

وأساسها $r = 1/2$ وبداية من الحد الرابع حدود المتتالية (u_n)

تشكل متتالية هندسية أساسها $6/5$

(1) أحسب u_2, u_3, u_4 ثم u_n بدلالة n

(2- أ) أحسب $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$. ب) أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$

الحل

$$(1) \quad u_2 = u_1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, \quad u_3 = u_2 + \frac{1}{2} = 2, \quad u_4 = u_3 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$

ومن أجل $n \geq 4$ فإن :

$$u_n = u_4 \times q^{n-4} = \frac{5}{2} \times \left(\frac{6}{5} \right)^{n-4} = \frac{5}{2} \times \frac{6}{5} \times \left(\frac{6}{5} \right)^{n-5} = 3 \left(\frac{6}{5} \right)^{n-5}$$

$$S_n = (u_1 + u_2 + u_3) + (u_4 + \dots + u_n) = \frac{9}{2} + (u_4 + \dots + u_n)$$

($u_4 + \dots + u_n$) تمثل مجموع ($n-3$) حدا لمتتالية هندسية حدها الأول $u_4 = 5/2$ وأساسها $q = 6/5$ ومنه

$$u_4 + \dots + u_n = u_4 \times \frac{q^{n-3} - 1}{q - 1} = \frac{25}{2} \times \left[\left(\frac{6}{5} \right)^{n-3} - 1 \right]$$

$$S_n = \frac{9}{2} + \frac{25}{2} \times \left[\left(\frac{6}{5} \right)^{n-3} - 1 \right] : \text{ ومنه}$$

$$(ب) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty \quad (\text{لأن } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{6}{5} \right)^{n-3} = +\infty)$$

تمرين 18

(u_n) متتالية هندسية متناقصة معرفة على \mathbb{N}^* أساسها q حيث

$$u_1 \times u_2 \times u_3 = \frac{125}{8} \quad \text{و} \quad u_1 - \frac{5}{12}, u_2, u_3 \text{ تمثل حدود متتالية}$$

لمتتالية حسابية. (1) أحسب u_1, u_2, u_3 والأساس q للمتتالية (u_n)

(2) أحسب المجموع $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$

(3) أحسب الجداء $P_n = u_1 \times u_2 \times \dots \times u_n$

الحل

(1) بما أن (u_n) متتالية هندسية فإن : $u_1 \times u_3 = (u_2)^2$ ومنه:

$$u_1 \times u_2 \times u_3 = (u_2)^3 = \frac{125}{8} = \left(\frac{5}{2} \right)^3 \quad \text{ومنه} \quad u_2 = \frac{5}{2}$$

$$\text{ومنه : } (*) \quad u_1 \times u_3 = \frac{125}{8} \div \frac{5}{2} = \frac{25}{4}$$

$u_3, u_2, \left(u_1 - \frac{5}{12} \right)$ حدود متتالية حسابية فإن

$$u_1 + u_3 = \frac{65}{12} \quad (**) \quad \text{ومنه} \quad \left(u_1 - \frac{5}{12} \right) + u_3 = 2u_2 = 5$$

$$\begin{cases} u_1 + u_3 = \frac{65}{12} \\ u_1 \times u_3 = \frac{25}{4} \end{cases} \quad \text{من } (*) \text{ و } (**): \text{ نجد}$$

ومنه :

$$u_3 = \frac{65}{12} - u_1 \quad \text{و} \quad u_1^2 - \frac{65}{12}u_1 + \frac{25}{4} = 0 \quad \text{ومنه :}$$

$$\left(u_3 = \frac{15}{4} \text{ و } u_1 = \frac{5}{3} \right) \quad \text{أو} \quad \left(u_3 = \frac{5}{3} \text{ و } u_1 = \frac{15}{4} \right)$$

وبما أن (u_n) متتالية متناقصة فيكون $u_1 > u_3$

$$\text{إذن : } u_1 = \frac{15}{4}, \quad u_2 = \frac{5}{2}, \quad u_3 = \frac{5}{3}$$

ويكون أساس المتتالية (u_n) هو $q = \frac{u_2}{u_1} = \frac{2}{3}$.

$$S_n = u_1 + \dots + u_n = u_1 \frac{1 - (2/3)^n}{1 - 2/3} = \frac{45}{4} \left[1 - \left(\frac{2}{3} \right)^n \right] \quad (2)$$

II. نفرض أن الحد الذي نبدأ منه هو v_p ومنه مجموع العشرة الحدود $p = 75$ ومنه $u_p = u_1 + (p-1)r = 6 + (p-1) \times 4 = 302$

المتتابعة التي حدها الأول v_p يساوي $v_p \times \frac{1-q^{10}}{1-q}$

لدينا حسب المعطيات $v_p \times \frac{1-q^{10}}{1-q} = \frac{1023}{512}$ و $q = \frac{1}{2}$

ومنه : $v_p \times \left(\frac{2^{10}-1}{2^9} \right) = v_p \times \frac{1023}{512} = \frac{1023}{512}$

ومنه : $v_p = 1$

نعلم أن $v_p = 16 \times \left(\frac{1}{2} \right)^p = 1$ ومنه $\left(\frac{1}{2} \right)^p = \frac{1}{16}$ ومنه $p = 4$ إذن الحد الذي نبدأ منه هو v_4 ورتبته هي الرتبة الخامسة.

تمرين 20

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة على \mathbb{N} بحدها العام $u_n = \frac{2-n}{2}$.

(1) برهن أن (u_n) متتالية حسابية يطلب تعيين حدها الأول وأساسها.

(2) لتكن المتتالية $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة بـ : $v_n = e^{u_n}$.

برهن أن (v_n) متتالية هندسية متقاربة.

(3- أ) أحسب المجموع $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

(ب) أحسب الجداء $P_n = v_1 \times v_2 \times \dots \times v_n$

$$P_n = u_1 \times u_2 \times \dots \times u_n = u_1 \times u_1 q \times u_1 q^2 \times \dots \times u_1 q^{n-1} =$$

$$(3) = (u_1)^n \times q^{1+2+\dots+n-1} = \left(\frac{15}{4} \right)^n \times \left(\frac{2}{3} \right)^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

لأن $1+2+\dots+(n-1)$ يمثل مجموع 1 إلى $(n-1)$ حد لمتتالية حسابية حدها الأول 1 وحدها الأخير $(n-1)$.

تمرين 19

I. (u_n) متتالية حسابية حدها الأول $u_1 = 6$ ومجموع حدودها الستة الأولى ينقص عن مجموع حدودها الثلاثة التي تليها بـ 6.

(1) عين أساس المتتالية (u_n) . (2) عين رتبة الحد الذي قيمته 302

II. (v_n) متتالية هندسية حدها الأول $v_0 = 16$ وأساسها $q = \frac{1}{2}$.

نريد حساب مجموع 10 حدود متتابعة للمتتالية (v_n) بحيث يكون

مجموعها يساوي $\frac{1023}{512}$. ما هي رتبة الحد الذي نبدأ منه ؟

الحل

$$(u_7 + u_8 + u_9) - (u_1 + u_2 + \dots + u_6) =$$

$$(1) \quad = (3u_1 + 21r) - (6u_1 + 15r) = -3u_1 + 6r = 6$$

نعلم أن $u_1 = 6$ ومنه : $-18 + 6r = 6$ ومنه : $r = 4$

(2) لتكن p رتبة الحد الذي قيمته 302 ومنه :

التراجعية $2nu_{n+1} = (n+1)u_n$ لكل n من \mathbb{N}^* .

من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم نضع $v_n = \frac{u_n}{n}$

(1) برهن أن المتتالية (v_n) هي متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها

2- (أ) أحسب v_n ثم u_n بدلالة n . (ب) برهن أن (u_n) متقاربة

(3) أحسب بدلالة n : $\alpha_n = v_1 \times v_2 \times \dots \times v_n$

الحل

(1) تكون المتتالية (v_n) هندسية إذا تحقق $v_{n+1} = v_n \times q$

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1}}{n+1} = \frac{n+1}{2n} u_n \times \frac{1}{n+1} = \frac{1}{2} \times \frac{u_n}{n} = \frac{1}{2} \times v_n$$

إذن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$ وحدها الأول $v_1 = \frac{1}{2}$

2- (أ) بما أن (v_n) متتالية هندسية فيكون حدها العام : $v_n = v_1 q^{n-1}$

ومنه $v_n = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{2^n}$ لدينا $v_n = \frac{u_n}{n}$ ومنه $u_n = nv_n$

إذن $u_n = n \times \frac{1}{2^n} = \frac{n}{2^n}$ (ب) بما أن $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{2^n} = 0$

إذن المتتالية (u_n) متقاربة وتتقارب إلى 0

(3)

$$\alpha_n = v_1 \times v_2 \times \dots \times v_n = v_1 \times v_1 q \times v_1 q^2 \times \dots \times v_1 q^{n-1} =$$

الحل

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2-(n+1)}{2} - \frac{2-n}{2} = -\frac{1}{2} \quad (1)$$

ومنه (u_n) متتالية حسابية حدها الأول $u_0 = 1$ وأساسها $r = -\frac{1}{2}$

$$v_{n+1} = e^{u_{n+1}} = e^{\frac{2-(n+1)}{2}} = e^{\frac{2-n}{2} - \frac{1}{2}} = e^{\frac{2-n}{2}} \times e^{-\frac{1}{2}} = e^{-\frac{1}{2}} \times v_n \quad (2)$$

إذن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = e^{-\frac{1}{2}}$.

بما أن $-1 < q < 1$ فالمتتالية (v_n) متقاربة وتتقارب إلى 0

$$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n = (u_0 + u_n) \times \frac{n+1}{2} = \quad (3)$$

$$= (u_0 + u_0 + nr) \times \left(\frac{n+1}{2}\right) = \left(2 - \frac{1}{2}n\right) \times \frac{n+1}{2}$$

$$P_n = v_0 \times v_1 \times \dots \times v_n = v_0 \times (v_0 q) \times \dots \times (v_0 q^n) \quad (ب)$$

$$= (v_0)^{n+1} \times q^{1+\dots+n} = e^{n+1} \times \left(e^{-\frac{1}{2}}\right)^{\frac{n(n+1)}{2}}$$

$$\text{(لأن } v_0 = e^{u_0} = e \text{ و } 1+2+3+\dots+n = (n+1) \times \frac{n}{2} \text{)}$$

تمرين 21

لتكن المتتالية (u_n) المعرفة على \mathbb{N}^* بحدها الأول $u_1 = \frac{1}{2}$ والعلاقة

2- أ) تكون المتتالية (v_n) هندسية إذا كان : $v_{n+1} = v_n \times q$

$$v_{n+1} = u_{n+1} - \frac{2}{1-\alpha} = \alpha u_n + 2 - \frac{2}{1-\alpha} =$$

$$= \alpha u_n + \frac{2(1-\alpha)-2}{1-\alpha} = \alpha \left(u_n - \frac{2}{1-\alpha} \right) = \alpha \times v_n$$

إن (v_n) هي متتالية هندسية حدها الأول $v_0 = 1 - \frac{2}{1-\alpha} = \frac{\alpha+1}{\alpha-1}$

وأساسها $q = \alpha$. ب) تكون المتتالية الهندسية (v_n) متقاربة إذا كان

أساسها $\alpha \in]-1; 1[$ وفي هذه الحالة تكون $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$.

تمرين 23

(u_n) متتالية عددية معرفة على \mathbb{N} بحددها الأول $u_0 = 0$ ومن أجل

كل عدد طبيعي n بالعلاقة التراجعية : $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 6}$.

(1) برهن أن المتتالية (v_n) متزايدة تماما .

(2) برهن أن من أجل كل عدد طبيعي n فإن : $u_n \leq 3$

(3) برهن أن المتتالية (u_n) متقاربة

الحل

(1) (u_n) متتالية متزايدة يعني لكل n من \mathbb{N} فإن : $u_{n+1} - u_n > 0$

لنبرهن أن المتتالية (u_n) متزايدة نستعمل البرهان بالتراجع .

نعتبر في المجموعة \mathbb{N} الخاصية p المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n

$$= v_1^n \times q^{1+2+\dots+(n-1)} = \frac{1}{2^n} \times \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{n(n-1)}{2}} = \left(\frac{1}{2} \right)^{n+\frac{n(n-1)}{2}}$$

تمرين 22

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة على \mathbb{N} كما يلي :

$u_0 = 1$ و $u_n = \alpha u_{n-1} + 2$ ($\alpha \in \mathbb{R}$) لكل n من \mathbb{N}^*

1- أ) عين α حتى تكون (u_n) متتالية ثابتة .

ب) ما طبيعة المتتالية (u_n) إذا كان $\alpha = 1$.

2) نفرض أن $\alpha \neq -1$ و $\alpha \neq 1$ ونعتبر المتتالية (v_n) المعرفة على \mathbb{N}

من أجل كل عدد طبيعي n بـ : $v_n = u_n - \frac{2}{1-\alpha}$

أ) برهن أن المتتالية (v_n) هي متتالية هندسية يطلب تعيين حدها الأول v_0 وأساسها q

ب) عين قيم α حتى تكون المتتالية (v_n) متقاربة ثم أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$

الحل

1- أ) تكون المتتالية (u_n) ثابتة إذا تحقق لكل n من \mathbb{N} : $u_{n+1} = u_n$

وحسب المعطيات لدينا $u_0 = 1$ ومنه المتتالية (u_n) ثابتة لما :

$u_{n+1} = u_n = u_0 = 1$ ومنه : $\alpha \times 1 + 2 = 1$ ومنه : $\alpha = -1$

ب) إذا كان $\alpha = 1$ فإن : $u_n = u_{n-1} + 2$ ومنه : $u_n - u_{n-1} = 2$

إن المتتالية (u_n) هي متتالية حسابية أساسها 2.

$$p(n): u_{n+1} - u_n > 0 : \text{بـ}$$

من أجل $n = 0$ لدينا $u_1 - u_0 = \sqrt{6} > 0$. إذن $p(0)$ محققة .

لنفرض أن $p(n)$ صحيحة أي $u_{n+1} - u_n > 0$ ولنبرهن صحة

$$p(n+1) \text{ أي } u_{n+2} - u_{n+1} > 0 .$$

$$u_{n+2} - u_{n+1} = \sqrt{u_{n+1} + 6} - \sqrt{u_n + 6} =$$

$$= \frac{(u_{n+1} + 6) - (u_n + 6)}{\sqrt{u_{n+1} + 6} + \sqrt{u_n + 6}} = \frac{u_{n+1} - u_n}{\sqrt{u_{n+1} + 6} + \sqrt{u_n + 6}}$$

لدينا $u_{n+1} - u_n > 0$ حسب فرضية البرهان بالتراجع ومنه

$$\frac{u_{n+1} - u_n}{\sqrt{u_{n+1} + 6} + \sqrt{u_n + 6}} > 0 \text{ ومنه } u_{n+2} - u_{n+1} > 0$$

إذن $p(n+1)$ صحيحة ، ومنه الخاصية $p(n)$ صحيحة من أجل

كل عدد طبيعي n ($u_{n+1} - u_n > 0$) ومنه المتتالية (u_n) متزايدة .

(2) لكي نبرهن أن من أجل كل عدد طبيعي n فإن $u_n \leq 3$ نستعمل البرهان بالتراجع .

لتكن $p(n)$ خاصية معرفة في \mathbb{N} كما يلي : $u_n \leq 3$ لكل n من \mathbb{N}

من أجل $n = 0$ فإن $u_0 = 0$ ومنه $p(0)$ صحيحة

لنفرض أن $p(n)$ صحيحة أي $u_n \leq 3$ ولنبرهن على صحة

$$p(n+1) \text{ أي } u_{n+1} \leq 3 . \text{ لدينا حسب الفرضية : } u_n \leq 3$$

$$\text{ومنه } u_n + 6 \leq 3 + 6 \text{ ومنه } \sqrt{u_n + 6} \leq 3 \text{ ومنه } u_{n+1} \leq 3$$

إذن $p(n+1)$ صحيحة ، ومنه $p(n)$ صحيحة من أجل كل عدد

$$\text{طبيعي } n \text{ أي : } u_n \leq 3$$

(3) بما أن المتتالية (u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى فهي متقاربة .

تمرين 24

$$\begin{cases} u_0 = \alpha \\ \forall n \in \mathbb{N} : u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n + \frac{9}{4} \end{cases}$$

نعتبر المتتالية العددية المعرفة بـ :

(1) عين α حتى تكون المتتالية (u_n) ثابتة .

(2) لتكن المتتالية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ :

$$v_n = u_n + k \text{ حيث } k \text{ عدد حقيقي . عين قيمة } \alpha \text{ حتى تكون}$$

المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعيين حدها الأول v_0 وأساسها q .

(3) في ما يأتي نأخذ $k = -3$ و $\alpha = 4$.

(أ) أحسب v_n و u_n بدلالة n . (ب) أدرس تغيرات المتتالية (v_n)

(ج) أحسب $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1}$. (د) أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$

الحل

$$(u_n) \text{ ثابتة يعني } u_0 = u_1 = \dots = u_n = u_{n+1} = \alpha$$

$$\text{لدينا } u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n + \frac{9}{4} \text{ ومنه : } \alpha = \frac{1}{4}\alpha + \frac{9}{4} \text{ ومنه } \alpha = 3$$

(2) تكون المتتالية (v_n) هندسية إذا تحقق : $v_{n+1} = v_n \times q$

تمرين 25

نعتبر المتتالية الحقيقية (u_n) المعرفة بـ: $u_0 = 1$ و $u_1 = 2$

وبالعلاقة التراجعية: $u_{n+2} = \frac{3}{2}u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n$ لكل n من \mathbb{N}

لتكن المتتالية (v_n) المعرفة على \mathbb{N} بـ: $v_n = u_{n+1} - u_n$

(1) برهن بأن المتتالية (v_n) هي متتالية هندسية يطلب تعيين حدها الأول v_0 وأساسها q .

2- (أ) أحسب v_n بدلالة n . (ب) برهن أن المتتالية (v_n) متناقصة

3- (أ) أحسب المجموع: $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_{n-1}$

(ب) استنتج عبارة u_n بدلالة n ثم أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

الحل

(1) تكون المتتالية (v_n) هندسية إذا تحقق $v_{n+1} = v_n \times q$

$$v_{n+1} = u_{n+2} - u_{n+1} = \frac{3}{2}u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n - u_{n+1} =$$

$$= \frac{1}{2}(u_{n+1} - u_n) = \frac{1}{2}v_n$$

إذن (v_n) متتالية هندسية حدها الأول $v_0 = u_1 - u_0 = 1$ وأساسها $\frac{1}{2}$

$$v_n = v_0 q^n = \frac{1}{2^n} \quad (2-أ)$$

$$v_{n+1} = u_{n+1} + k = \frac{1}{4}u_n + \frac{9}{4} + k = \frac{1}{4}(u_n + k) + \frac{3k}{4} + \frac{9}{4}$$

$$= \frac{1}{4}v_n + \left(\frac{3}{4}k + \frac{9}{4}\right)$$

تكون المتتالية (v_n) هندسية إذا كان: $\frac{3k}{4} + \frac{9}{4} = 0$ ومنه $k = -3$

3- (أ) حسب السؤال السابق إذا كان $k = -3$ فتكون المتتالية (v_n)

هندسية أساسها $\frac{1}{4}$ وحدها الأول $v_0 = \alpha - 3 = 4 - 3 = 1$

$$\text{ومنه: } v_n = v_0 \times q^n = \left(\frac{1}{4}\right)^n \text{ و } u_n = v_n + 3 = \frac{1}{4^n} + 3$$

$$(ب) \quad v_{n+1} - v_n = \frac{1}{4^{n+1}} - \frac{1}{4^n} = \frac{1-4}{4^{n+1}} = -\frac{3}{4^{n+1}} < 0$$

إذن المتتالية (v_n) متناقصة.

$$(ج) \quad S_n = u_0 + \dots + u_{n-1} = (v_0 + 3) + \dots + (v_{n-1} + 3) =$$

$$= (v_0 + \dots + v_{n-1}) + 3n =$$

$$= v_0 \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^n}{1 - \frac{1}{4}} + 3n = \frac{4}{3} \left(1 - \frac{1}{4^n}\right) + 3n$$

$$(د) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty \quad (\text{لأن } \frac{1}{4^n} \rightarrow 0 \text{ و } 3n \rightarrow +\infty \text{ لما } n \rightarrow +\infty)$$

الحل

(1) $p(n)$ خاصية معرفة على \mathbb{N}^* بـ: $u_n \leq 3$

لدينا $u_1 = -1 \leq 3$ ومنه $p(1)$ صحيحة. لنفرض أن

$p(n)$ محققة أي $u_n \leq 3$ ولنبرهن على صحة $p(n+1)$ أي

$u_{n+1} \leq 3$. لدينا حسب الفرضية: $u_n \leq 3$

ومنه: $\frac{n}{2(n+1)} u_n \leq \frac{3n}{2(n+1)}$ ومنه:

ومنه: $\frac{n}{2(n+1)} u_n + \frac{3(n+2)}{2(n+1)} \leq \frac{3n}{2(n+1)} + \frac{3(n+2)}{2(n+1)}$

$u_{n+1} \leq \frac{6(n+1)}{2(n+1)}$ ومنه $u_{n+1} \leq 3$. بما أن $p(n+1)$ محققة

فإن $p(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم أي: $u_n \leq 3$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{n}{2(n+1)} u_n + \frac{3(n+2)}{2(n+1)} - u_n = \quad (2)$$

$$= \left(\frac{n}{2(n+1)} - 1 \right) u_n + \frac{3(n+2)}{2(n+1)} = -\frac{n+2}{2(n+1)} u_n + \frac{3(n+2)}{2(n+1)}$$

$$= -\frac{n+2}{2(n+1)} \times (u_n - 3) > 0$$

$$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{2^n} = \frac{1-2}{2^{n+1}} = -\frac{1}{2^{n+1}} < 0 \quad (ب)$$

إذن (v_n) هي متتالية متناقصة. 3-1) لدينا:

$$S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_{n-1} = v_0 \frac{1-q^n}{1-q} = 2 \left(1 - \frac{1}{2^n} \right)$$

(ب) نعلم أن: $v_n = u_{n+1} - u_n$ ولدينا: $S_n = v_0 + \dots + v_{n-1}$

$$S_n = (u_1 - u_0) + \dots + (u_n - u_{n-1}) = u_n - u_0 = u_n - 1$$

ومنه: $u_n = S_n + 1 = 3 - \frac{1}{2^{n-1}}$ وتكون $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$.

تمرين 26

لتكن المتتالية (u_n) المعرفة على \mathbb{N}^* بـ:

$$u_1 = -1 \text{ و } u_{n+1} = \frac{n}{2(n+1)} \times u_n + \frac{3(n+2)}{2(n+1)} \text{ لكل } n \text{ من } \mathbb{N}^*$$

(1) باستعمال البرهان بالتراجع برهن أن لكل n من \mathbb{N} فإن: $u_n \leq 3$

(2) أدرس تغيرات المتتالية (u_n) واستنتج أن (u_n) متقاربة.

(3) نعتبر المتتالية $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ المعرفة بـ: $v_n = n(3 - u_n)$.

- برهن أن المتتالية (v_n) هندسية وعين حدها الأول وأساسها.

(4) عبر عن v_n ثم u_n بدلالة n

$$\left(\begin{array}{l} \text{لأن } -\frac{n+2}{2(n+1)} < 0 \text{ و } u_n - 3 \leq 0 \end{array} \right).$$

بما أن $u_{n+1} - u_n > 0$ فالمتتالية (u_n) متزايدة وبما أنها محدودة من الأعلى بالعدد 3 فهي متقاربة

(3) تكون المتتالية (v_n) هندسية إذا تحقق $\forall n \in \mathbb{N}^* : v_{n+1} = v_n \times q$

$$v_{n+1} = (n+1)(3 - u_{n+1}) =$$

$$= (n+1) \left[3 - \frac{n}{2(n+1)} u_n - \frac{3(n+2)}{2(n+1)} \right] =$$

$$= 3(n+1) - \frac{n}{2} u_n - \frac{3(n+2)}{2} = \frac{6(n+1) - 3(n+2)}{2} - \frac{n}{2} u_n =$$

$$= \frac{3n}{2} - \frac{n}{2} u_n = \frac{1}{2} n (3 - u_n) = \frac{1}{2} v_n$$

إذن المتتالية (v_n) هندسية حدها الأول $v_1 = 4$ وأساسها $\frac{1}{2}$

$$v_n = v_1 q^{n-1} = 4 \times \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} = 2^2 \times \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{1}{2^{n-3}} \quad (4)$$

$$\text{لدينا : } v_n = n(3 - u_n) \text{ ومنه : } u_n = 3 - \frac{v_n}{n} = 3 - \frac{1}{n} \times \frac{1}{2^{n-3}}$$

تمرين 27

(u_n) متتالية عددية معرفة على \mathbb{N} بـ :

$$\begin{cases} 3u_{n+2} - 5u_{n+1} + 2u_n = 0 \\ u_0 = 1, \quad u_1 = 3 \end{cases}$$

نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة بـ $v_n = u_{n+1} - u_n$ لكل n من \mathbb{N}
(1) برهن أن المتتالية (v_n) هي متتالية هندسية يطلب تعيين حدها الأول وأساسها

$$(2) \text{ أ) أحسب } S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_{n-1}$$

ب) أكتب S_n بدلالة u_n ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n .

ج) برهن بأن المتتالية (u_n) هي متتالية رتيبة.

الحل

(1) تكون المتتالية (v_n) هندسية إذا تحقق $\forall n \in \mathbb{N} : v_{n+1} = v_n \times q$

$$v_{n+1} = u_{n+2} - u_{n+1} = \frac{5}{3} u_{n+1} - \frac{2}{3} u_n - u_{n+1} = \frac{2}{3} u_{n+1} - \frac{2}{3} u_n =$$

$$= \frac{2}{3} (u_{n+1} - u_n) = \frac{2}{3} v_n$$

إذن (v_n) هي متتالية هندسية حدها الأول $v_0 = 2$ وأساسها $\frac{2}{3}$.

$$S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = 2 \left[1 - \left(\frac{2}{3} \right)^{n+1} \right] \quad (2)$$

$$S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n = (u_1 - u_0) + \dots + (u_{n+1} - u_n) \quad \text{ب)}$$

$$\pi_n = u_0 + 4u_1 + 4^2 u_2 + \dots + 4^n u_n$$

$$u_0 \times u_1 \times \dots \times u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n(n+1)} \quad \text{د) اثبت أن :}$$

الحل

(1) تكون المتتالية (v_n) ثابتة لما جميع حدودها متساوية أي :

$$v_0 = v_1 = \dots = v_n = v_{n+1} = \alpha$$

لدينا : $4v_{n+1} = v_n + 9$ ومنه $4\alpha = \alpha + 9$ ومنه $\alpha = 3$

$$(2) \quad \text{لدينا : } 4v_{n+1} = v_n + 9 \quad \text{ومنه : } v_{n+1} = \frac{1}{4}v_n + \frac{9}{4}$$

$$v_1 = \frac{1}{4}v_0 + \frac{9}{4} = 1 + \frac{9}{4} = \frac{13}{4}, \quad v_2 = \frac{1}{4}v_1 + \frac{9}{4} = \frac{49}{16}$$

$$v_3 = \frac{1}{4}v_2 + \frac{9}{4} = \frac{193}{64}$$

3- أ) تكون (u_n) متتالية هندسية إذا تحقق $u_{n+1} = u_n \times q$

$$u_{n+1} = v_{n+1} - 3 = \frac{1}{4}v_n + \frac{9}{4} - 3 = \frac{1}{4}(v_n - 3) = \frac{1}{4}u_n$$

إذن (u_n) هي متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{4}$.

$$\text{ب) } u_n = u_0 \times q^n = (v_0 - 3) \times \left(\frac{1}{4}\right)^n = \frac{1}{4^n}$$

$$S_n = u_n - u_0 = u_n - 1$$

$$\text{لدينا } S_n = u_n - 1 \quad \text{ومنه : } u_n = S_n + 1 = 6 \left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n\right] + 1$$

ج -

$$u_{n+1} - u_n = 6 \left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right] - 6 \left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n\right] =$$

$$= 6 \left(\frac{2}{3}\right)^n \left(1 - \frac{2}{3}\right) = 2 \left(\frac{2}{3}\right)^n > 0$$

بما أن $u_{n+1} - u_n > 0$ فإن المتتالية (u_n) متزايدة (رتيبة).

تمرين 28

لتكن المتتالية (v_n) المعرفة على \mathbb{N} كما يلي :

$$v_0 = \alpha \quad (\alpha \in \mathbb{R}) \quad \text{ومن أجل كل عدد طبيعي } n : 4v_{n+1} = v_n + 9$$

(1) عين قيمة العدد α حتى تكون المتتالية (v_n) ثابتة.

نفرض في كل ما يلي $\alpha = 4$. (2) أحسب v_3, v_2, v_1

(3) نعرف المتتالية (u_n) كما يلي : $u_n = v_n - 3$ لكل n من \mathbb{N}

أ) أثبت أن (u_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها.

ب) أكتب u_n ثم v_n بدلالة n .

ج) أحسب المجموعين : $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$

$$= q^{1+\dots+n} = q^{\frac{n(n+1)}{2}} = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{n(n+1)}{2}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n(n+1)}$$

لأن $u_0 = 1$ و $1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$

تمرين 29

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متتالية عددية معرفة كما يلي :

$$u_0 = 3 \text{ و } u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n - 2n + \frac{5}{3} \text{ لكل } n \text{ من } \mathbb{N}$$

(1) أحسب u_1, u_2, u_3 . لتكن المتتالية (v_n) المعرفة على \mathbb{N} بـ :

$$v_n = u_n + \alpha n + \beta \text{ من أجل كل } n \text{ من } \mathbb{N} \text{ حيث } \alpha, \beta \text{ عدنان}$$

(2) عين العددين α, β بحيث تكون (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{2}{3}$

(3) نفرض أن في ما يأتي $\alpha = 6$ و $\beta = -23$.

(أ) أكتب عبارة v_n ثم u_n بدلالة n .

$$\text{(ب) نضع : } \pi_n = u_0 + \dots + u_n, \quad S_n = v_0 + \dots + v_n$$

أحسب S_n بدلالة n ثم استنتج عبارة π_n .

الحل

$$(1) \quad u_1 = \frac{2}{3}u_0 + \frac{5}{3} = \frac{11}{3}, \quad u_2 = \frac{19}{9}, \quad u_3 = \frac{-45}{27}$$

$$\text{لدينا : } u_n = v_n - 3 \text{ ومنه : } v_n = u_n + 3 = \frac{1}{4^n} + 3$$

$$S_n = v_0 + \dots + v_n = (u_0 + 3) + \dots + (u_n + 3) = \quad (ج)$$

$$= (u_0 + \dots + u_n) + 3(n+1)$$

وبما أن $u_0 + \dots + u_n$ يمثل مجموع $(n+1)$ حداً لمتتالية هندسية

حدها الأول $u_0 = 1$ وأساسها $q = \frac{1}{4}$ فإن :

$$u_0 + \dots + u_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3} \left(1 - \frac{1}{4^{n+1}}\right)$$

$$\text{ومنه : } S_n = \frac{4}{3} \left(1 - \frac{1}{4^{n+1}}\right) + 3(n+1)$$

$$\begin{aligned} \pi_n &= u_0 + 4u_1 + 4^2u_2 + \dots + 4^nu_n = \\ &= u_0 + 4u_0q + 4^2u_0q^2 + \dots + 4^nu_0q^n = \\ &= u_0 \left[1 + 4q + (4q)^2 + \dots + (4q)^n \right] = \\ &= u_0 (1 + 1 + 1 + \dots + 1) = (n+1) \end{aligned}$$

$$(\text{لأن } u_0 = 1 \text{ و } 4q = 4 \times \frac{1}{4} = 1)$$

$$u_0 \times u_1 \times \dots \times u_n = u_0 \times (u_0q) \times \dots \times (u_0q^n) = \quad (د)$$

$$v_n = u_n + 6n - 23 : \text{لدينا} \quad v_n = v_0 \times q^n = (-20) \times \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

$$u_n = v_n - 6n + 23 = (-20) \left(\frac{2}{3}\right)^n - 6n + 23 : \text{ومنه}$$

$$S_n = v_0 + \dots + v_n = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \quad (\text{ب})$$

$$S_n = (-60) \left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \right]$$

$$\pi_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n =$$

$$= (v_0 + 23) + (v_1 - 6 + 23) + \dots + (v_n - 6n + 23)$$

$$= (v_0 + v_1 + \dots + v_n) + (23 + 17 + 11 + \dots + (23 - 6n))$$

$$23 + 17 + 11 + \dots + (23 - 6n) \text{ يمثل مجموع } (n+1) \text{ حدا}$$

$$\text{لمتتالية حسابية حدها الأول 23 و حدها الأخير } (23 - 6n) : \text{ومنه}$$

$$23 + 17 + \dots + (23 - 6n) = [23 + (23 - 6n)] \times \frac{n+1}{2} =$$

$$= (23 - 3n)(n+1)$$

$$\pi_n = S_n + (23 - 3n)(n+1) =$$

$$= -60 \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \right) + (23 - 3n)(n+1)$$

$$(2) \quad (v_n) \text{ متتالية هندسية أساسها } \frac{2}{3} \text{ يعني } \forall n \in \mathbb{N} : v_{n+1} = \frac{2}{3} v_n$$

$$u_{n+1} = u_{n+1} + \alpha(n+1) + \beta = \frac{2}{3} u_n - 2n + \frac{5}{3} + \alpha(n+1) + \beta$$

$$= \frac{2}{3} u_n - 2n + \frac{5}{3} + \alpha n + \alpha + \beta$$

$$= \frac{2}{3} (u_n + \alpha n + \beta) + \frac{1}{3} \alpha n + \frac{1}{3} \beta + \alpha - 2n + \frac{5}{3}$$

$$= \frac{2}{3} v_n + \left(\frac{\alpha}{3} - 2 \right) n + \frac{1}{3} \beta + \alpha + \frac{5}{3}$$

$$\text{حتى تكون } (v_n) \text{ متتالية هندسية أساسها } \frac{2}{3} \text{ يجب أن :}$$

$$\left(\frac{\alpha}{3} - 2 \right) n + \frac{1}{3} \beta + \alpha + \frac{5}{3} = 0$$

$$\text{ومنه : } \begin{cases} \frac{\alpha}{3} - 2 = 0 \\ \frac{1}{3} \beta + \alpha + \frac{5}{3} = 0 \end{cases} \quad \text{ومنه : } \begin{cases} \alpha = 6 \\ \beta = -23 \end{cases}$$

$$3- \text{أ) إذا كان } \alpha = 6 \text{ و } \beta = -23 \text{ فإن } (v_n) \text{ متتالية هندسية}$$

$$\text{(سؤال سابق) حدها الأول } v_0 = u_0 + \beta = -20 \text{ وأساسها } \frac{2}{3}$$

تمرين 30

(v_n) متتالية عددية معرفة على \mathbb{N} بحددها الأول $v_0 = -\frac{1}{2}$

والعلاقة التراجعية : $v_{n+1} = \frac{9v_n - 8}{2v_n + 1}$ لكل n من \mathbb{N}

(1) أثبت أن من أجل كل عدد طبيعي n فإن : $v_n \neq 2$

(2) (u_n) متتالية معرفة على \mathbb{N} بـ : $u_n = \frac{2v_n + 1}{v_n - 2}$

(أ) بين أن (u_n) متتالية حسابية يطلب تعيين حدها الأول وأساسها.

(ب) أحسب u_n بدلالة n ثم استنتج v_n بدلالة n .

(ج) أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ و $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$. ماذا نستنتج ؟

(3) أحسب بدلالة n المجموع : $S_n = u_1 + u_3 + u_5 + \dots + u_{2n+1}$

الحل

(1) لنبرهن أن $v_n \neq 2 \forall n \in \mathbb{N}$ نستعمل البرهان بالتراجع.

لتكن الخاصية $p(n)$ المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ : $v_n \neq 2$.

لدينا $v_0 = -\frac{1}{2} \neq 2$ إذن $p(0)$ محققة .

لنفرض أن $p(n)$ صحيحة ($v_n \neq 2$) ولنبرهن على صحة

$p(n+1)$ أي ($v_{n+1} \neq 2$) وهذا يعني نبرهن صحة الاستلزام :

$v_n \neq 2$ تستلزم $v_{n+1} \neq 2$. ونعلم أن :

($v_n \neq 2$ تستلزم $v_{n+1} \neq 2$) يكافئ ($v_{n+1} = 2$ تستلزم $v_n = 2$)

$$v_{n+1} = \frac{9v_n - 8}{2v_n + 1} = 2 \text{ ومنه } 9v_n - 8 = 2(2v_n + 1) \text{ ومنه } v_n = 2$$

بما أن $p(n)$ تستلزم $p(n+1)$ فإن $p(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n ($v_n \neq 2$)

(2-أ) (u_n) متتالية حسابية يعني : $u_{n+1} - u_n = r$ لكل n من \mathbb{N}

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2v_{n+1} + 1}{v_{n+1} - 2} - \frac{2v_n + 1}{v_n - 2} =$$

$$\frac{2 \times \frac{9v_n - 8}{2v_n + 1} + 1}{\frac{9v_n - 8}{2v_n + 1} - 2} - \frac{2v_n + 1}{v_n - 2} =$$

$$= \frac{20v_n - 15}{5v_n - 10} - \frac{2v_n + 1}{v_n - 2} = \frac{2v_n - 4}{v_n - 2} = \frac{2(v_n - 2)}{v_n - 2} = 2$$

إذن (u_n) متتالية حسابية أساسها 2 وحدها الأول $u_0 = 0$

(ب) $u_n = u_0 + nr = 2n$. لدينا : $u_n = \frac{2v_n + 1}{v_n - 2}$ ومنه :

$$v_n = \frac{2u_n + 1}{u_n - 2} = \frac{4n + 1}{2n - 2} \text{ ومنه : } v_n(u_n - 2) = 2u_n + 1$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n + 1}{2n - 2} = 2 , \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 2n = +\infty \text{ (ج)}$$

نستنتج أن المتتالية (v_n) متقاربة وأن المتتالية (u_n) متباعدة

(2) لدينا $u_n = 2n$ ومنه :

$$= 2, u_3 = 6, u_5 = 10, \dots, u_{2n+1} = 2(2n+1) = 4n+2$$

نلاحظ أن $2(2n-1), 2(2n+1), \dots, 14, 10, 6, 2$ هي

تمثل $(n+1)$ حدا متتبعاً لمتتالية حسابية حدها الأول 2

وحدها الأخير $u_{2n+1} = 4n+2$ وأساسها $r = 4$ ومنه :

$$S_n = u_1 + \dots + u_{2n+1} = (u_1 + u_{2n+1}) \left(\frac{n+1}{2} \right) = \\ = (4n+4) \left(\frac{n+1}{2} \right) = 2(n+1)^2$$

تمرين 31

(v_n) متتالية عددية معرفة على \mathbb{N} بـ : $v_0 = 0$ والعلاقة التراجعية :

$$\forall n \in \mathbb{N} : 2v_n = \alpha v_{n-1} + 2(\alpha - 2) \text{ حيث } \alpha \in \mathbb{R}^{++}.$$

(1) عين α حتى تكون المتتالية (v_n) ثابتة .

(2) نفرض أن $\alpha \geq 2$. (أ) برهن أن $v_n \geq 0 \forall n \in \mathbb{N}$.

(ب) برهن أن المتتالية (v_n) متزايدة .

(3) نفرض أن $\alpha \in \mathbb{R} - \{2\}$ ونعتبر المتتالية (u_n) المعرفة من أجل

$$u_n = 2(2 + v_n) \text{ بـ } n \text{ كل عدد طبيعي .}$$

(أ) بين أن (u_n) متتالية هندسية بطلب تعيين حدها الأول وأساسها .

(ب) احسب v_n بدلالة n و α .

(ج) عين قيم α حتى تكون (v_n) متقاربة

الحل

(v_n) ثابتة يعني : $v_0 = v_1 = \dots = v_{n-1} = v_n$.

لدينا : $2v_n = \alpha v_{n-1} + 2(\alpha - 2)$ ومنه تكون (v_n) ثابتة إذا كان

$$2v_0 = \alpha v_0 + 2(\alpha - 2) \text{ ومنه : } 0 = 2(\alpha - 2) \text{ ومنه } \alpha = 2$$

(2-أ) لنبرهن أن $\forall n \in \mathbb{N} : v_n \geq 0$ نستعمل البرهان بالتراجع .

لدينا $v_0 = 0$ ومنه $p(0)$ محققة . نفرض أن $p(n)$ صحيحة

$(v_n \geq 0)$ ولنبرهن على صحة $p(n+1)$ $(v_{n+1} \geq 0)$.

لدينا $v_n \geq 0$ (حسب الفرضية) و $v_{n+1} = \frac{\alpha}{2}v_n + (\alpha - 2)$.

$$v_n \geq 0 \text{ ومنه } \frac{\alpha}{2}v_n \geq 0 \text{ ومنه } \frac{\alpha}{2}v_n + (\alpha - 2) \geq 0 \text{ (لأن } \alpha \geq 2 \text{)}$$

أي $v_{n+1} \geq 0$.

بما أن $p(n+1)$ صحيحة فإن $p(n)$ صحيحة من أجل

كل عدد طبيعي n أي $v_n \geq 0$.

$$v_{n+1} - v_n = \frac{\alpha}{2}v_n + (\alpha - 2) - v_n = \left(\frac{\alpha}{2} - 1 \right) v_n + (\alpha - 2) =$$

$$= \frac{1}{2}(\alpha - 2)v_n + (\alpha - 2) = (\alpha - 2) \left(\frac{1}{2}v_n + 1 \right) \geq 0$$

(لأن $\alpha \geq 2$ و $v_n \geq 0$) . بما أن $v_{n+1} - v_n \geq 0$ فإن (v_n) متزايدة

3-أ) تكون (u_n) متتالية هندسية إذا تحقق $\forall n \in \mathbb{N} : u_{n+1} = u_n q$

$$u_{n+1} = 2(2 + v_{n+1}) = 2\left(2 + \frac{\alpha}{2}v_n + \alpha - 2\right) = 2\left(\frac{\alpha}{2}v_n + \alpha\right) = \frac{\alpha}{2} \times 2(v_n + 2) = \frac{\alpha}{2} u_n$$

إذن (u_n) متتالية هندسية حدها الأول $u_0 = 4$ وأساسها $q = \frac{\alpha}{2}$

ب) $u_n = u_0 q^n = 4\left(\frac{\alpha}{2}\right)^n$ لدينا $u_n = 2(2 + v_n)$

ومنه : $v_n = \frac{1}{2}u_n - 2 = 2\left(\frac{\alpha}{2}\right)^n - 2$

ج) تكون (v_n) متتالية متقاربة إذا كان $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \lambda$ ($\lambda \in \mathbb{R}$)

تكون (v_n) متقاربة إذا كان $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{\alpha}{2}\right)^n = 0$ وهذا يعني : $\left|\frac{\alpha}{2}\right| < 1$

$\left|\frac{\alpha}{2}\right| < 1$ يكافئ $-1 < \frac{\alpha}{2} < 1$ يكافئ $-2 < \alpha < 2$

إذا كان $\alpha \in]-2; 2[$ فالمتتالية (v_n) متقاربة وتتقارب نحو (-2)

تمرين 32

1) أحسب المجموع $s = 1 + 7 + 13 + \dots + (6n + 1)$

2) لتكن المتتالية (v_n) المعرفة على \mathbb{N} بـ :

$v_0 = 2$ والعلاقة التراجعية : $\forall n \in \mathbb{N} : v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n + 3n + \frac{13}{2}$

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بـ : $\forall n \in \mathbb{N} : u_n = v_n - 6n - 1$

أ) أوجد العلاقة التي تربط بين u_n و u_{n+1}

ب) عبر عن u_n ثم v_n بدلالة n

ج) أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ و $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

3) أحسب $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ و $\pi_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$

الحل

1) $1, 7, 13, \dots, (6n + 1)$ هي حدود متتابعة لمتتالية

حسابية حدها الأول 1 وأساسها $r = 6$ وحدها العام $u_n = 6n + 1$

إذا استبدلنا في عبارة الحد العام n بالقيم $\{0, 1, 2, 3, \dots, n\}$ نحصل

على $(n + 1)$ حدا متتابعا ومنه :

$$s = 1 + 7 + 13 + \dots + (6n + 1) = [1 + (6n + 1)] \times (n + 1) / 2 = (3n + 1)(n + 1)$$

$$u_{n+1} = v_{n+1} - 6(n + 1) - 1 = \frac{1}{2}v_n + 3n + \frac{13}{2} - 6n - 7 =$$

$$= \frac{1}{2}v_n - 3n - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(v_n - 6n - 1) = \frac{1}{2}u_n$$

(ب) لدينا $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n$ ومنه (u_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها

الأول $u_0 = v_0 - 1 = 1$ ومنه $u_n = u_0 q^n = \frac{1}{2^n}$

لدينا $u_n = v_n - 6n - 1$ ومنه $v_n = u_n + 6n + 1 = \frac{1}{2^n} + 6n + 1$

(ج) $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^n} = 0$

$$S_n = u_0 + \dots + u_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = 2 \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}} \right) \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \pi_n &= v_0 + v_1 + \dots + v_n = \\ &= (u_0 + 1) + (u_1 + 7) + \dots + (u_n + 6n + 1) = \\ &= (u_0 + u_1 + \dots + u_n) + (1 + 7 + \dots + 6n + 1) = \\ &= 2 \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}} \right) + (3n + 1)(n + 1) \end{aligned}$$

تمرين 33

لتكن المتتالية (u_n) المعرفة على \mathbb{N} بـ: $u_0 = 1$ و بالعلاقة:

$$\forall n \in \mathbb{N} : u_{n+1} = \alpha(u_n - 2) \text{ حيث } \alpha \in \mathbb{R}^*$$

(1) عين العدد الحقيقي α حتى تكون (u_n) متتالية ثابتة.

(2) نضع $\alpha = \frac{2}{3}$.

(أ) بين أن $\forall n \in \mathbb{N} : u_n \geq -4$ (ب) بين أن (u_n) متتالية متناقصة

(3) (v_n) متتالية معرفة على \mathbb{N} بـ: $v_n = u_n + 4$ عين α حتى تكون المتتالية (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين حدها الأول v_0 وأساسها q .

(4) نفرض أن $\alpha = \frac{2}{3}$. (أ) احسب $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

(ب) $P_n = (v_0)^3 + (v_1)^3 + \dots + (v_n)^3$

الحل

(1) (u_n) ثابتة يعني: $u_n = u_{n+1}$ لدينا $u_{n+1} = \alpha(u_n - 2)$

تكون (u_n) ثابتة لما $1 = \alpha(1 - 2)$ ومنه $\alpha = -1$

(2- أ) لنبرهن أن $\forall n \in \mathbb{N} : u_n \geq -4$ نستعمل البرهان بالتراجع. لدينا: $u_0 = 1 \geq -4$ ومنه $p(0)$ محققة.

لنفرض أن $p(n)$ صحيحة أي $u_n \geq -4$ ولنبرهن على صحة

$p(n+1)$ أي $u_{n+1} \geq -4$. لدينا فرضاً $u_n \geq -4$ ومنه:

$$u_{n+1} \geq -4 \text{ ومنه } u_n - 2 \geq -6 \times \frac{2}{3} \text{ ومنه } \frac{2}{3}(u_n - 2) \geq -4 \text{ ومنه } u_{n+1} \geq -4$$

إذن $p(n+1)$ صحيحة ومنه $p(n)$ صحيحة من أجل كل عدد

طبيعي n أي: $u_n \geq -4$ ($u_n + 4 \geq 0$)

نعلم أن $1 + q^3 + q^6 + \dots + q^{3n}$ يمثل مجموع $(n+1)$ حدا متتابعاً

لمتتالية هندسية حدها الأول 1 وأساسها $q^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$

$$1 + q^3 + q^6 + \dots + q^{3n} = \frac{1 - \left(\frac{8}{27}\right)^{n+1}}{1 - \frac{8}{27}} = \frac{27}{19} \left[1 - \left(\frac{8}{27}\right)^{n+1} \right]$$

$$P_n = 125 \times \frac{27}{19} \left[1 - \left(\frac{8}{27}\right)^{n+1} \right]$$

تمرين 34

في السنة 1995 صنع معمل 2000 دراجة ، نفرض أن عدد الدراجات المصنوعة في هذا المعمل يزداد كل عام بنسبة 5% .

- (1) ما هو عدد الدراجات الذي سيصنعها هذا المعمل في سنة 2000 .
- (2) في أي سنة يكون عدد الدراجات المصنوعة من طرف هذا المصنع أكبر من 50000 دراجة ؟

الحل

- (1) لنرمز بـ u_0 إلى عدد الدراجات التي صنعت في سنة 1995 أي: (دراجة) $u_0 = 20000$. و بعد سنة (سنة 1996) يكون عدد الدراجات التي يصنعها هذا المعمل : $u_1 = u_0 + 0,05u_0 = 1,05u_0$ في سنة 1997 يكون عدد الدراجات : $u_2 = u_1 + 0,05u_1 = 1,05u_1$.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2}{3}(u_n - 2) - u_n = -\frac{1}{3}(u_n + 4) \leq 0 \quad \text{ب)}$$

بما أن $u_{n+1} - u_n \leq 0$ فالمتتالية (u_n) متناقصة

(3) تكون (v_n) متتالية هندسية إذا تحقق $\forall n \in \mathbb{N} : v_{n+1} = v_n \times q$

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} + 4 = \alpha(u_n - 2) + 4 = \alpha(u_n + 4) - 6\alpha + 4 = \\ &= \alpha \times v_n - 6\alpha + 4 \end{aligned}$$

حتى تكون (v_n) متتالية هندسية يجب أن : $4 - 6\alpha = 0$ ومنه $\alpha = \frac{2}{3}$

لما $\alpha = \frac{2}{3}$ فالمتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{2}{3}$ وحدها الأول $v_0 = 5$

(4) لدينا $\alpha = \frac{2}{3}$ ومنه (v_n) متتالية هندسية.

أ-

$$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n = (v_0 - 4) + (v_1 - 4) + \dots + (v_n - 4) =$$

$$= (v_0 + v_1 + \dots + v_n) - 4(n+1) = v_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} =$$

$$= 15 \left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \right] - 4(n+1)$$

ب-

$$\begin{aligned} P_n &= (v_0)^3 + (v_1)^3 + \dots + (v_n)^3 = \\ &= (v_0)^3 + (v_0 q)^3 + \dots + (v_0 q^n)^3 = (v_0)^3 (1 + q^3 + \dots + q^{3n}) \end{aligned}$$

وفي سنة 1998 يكون عدد الدراجات: $u_3 = u_2 + 0,05u_2 = 1,05u_2$
وفي سنة $(1995 + n)$ يكون: $u_n = u_{n-1} + 0,05u_{n-1} = 1,05u_{n-1}$
إذن عدد الدراجات المصنوعة في هذا المعمل يمثل حدود متتالية هندسية حدها الأول $u_0 = 20000$ وأساسها $q = 1,05$.
عدد الدراجات التي يصنعها هذا المعمل في سنة 2000 هو:

$$u_5 = u_0 \times q^5 = 20000 \times (1,05)^5 = 25524$$

(2) نعلم أن عدد الدراجات التي يصنعها هذا المعمل بعد n سنة هو:
 $u_n = u_0 \times q^n = 20000 \times (1,05)^n$. إذن عدد السنوات التي يكون فيها الإنتاج أكبر من 50000 هو الحل للمترابطة:

$$20000 \times (1,05)^n > 50000 \text{ ومنه } (1,05)^n > 2,5$$

باستعمال اللوغارتم النبيري نحصل على: $n \ln 1,05 > \ln 2,5$
ومنه: $0,048 \times n > 0,916$ ومنه: $n > 19,08$

إذن $n = 20$ في سنة $(1995 + 20)$ أي سنة 2015.

تمرين 35

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة على \mathbb{N} بـ: $u_0 = 2$ والعلاقة:

$$u_n - 2u_{n+1} = 2n + 3 \text{ لتكن المتتالية } (v_n) \text{ المعرفة على } \mathbb{N}$$

$$\text{بـ: } \forall n \in \mathbb{N} : v_n = u_n + \alpha n - 1 \quad (\alpha \in \mathbb{R})$$

(1) عين العدد الحقيقي α حتى تكون (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين حدها الأول v_0 وأساسها q . في كل ما يأتي نفرض $\alpha = 2$

$$(2) \text{ استنتج أن : } v_n = \frac{1}{2^n} - 2n + 1$$

$$(3) \text{ نضع : } S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n \text{ . أحسب } S_n \text{ و } \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$$

الحل

$$(1) \text{ تكون } (v_n) \text{ متتالية هندسية إذا تحقق } \forall n \in \mathbb{N} : v_{n+1} = v_n q$$

$$\text{لدينا : } u_n - 2u_{n+1} = 2n + 3 \text{ ومنه : } u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n - n - \frac{3}{2}$$

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} + \alpha(n+1) - 1 = \\ &= \frac{1}{2}u_n - n - \frac{3}{2} + \alpha(n+1) - 1 = \\ &= \frac{1}{2}(u_n + \alpha n - 1) + \frac{1}{2}\alpha n - n + \alpha - 2 = \\ &= \frac{1}{2}v_n + \left(\frac{1}{2}\alpha n - n + \alpha - 2 \right) \end{aligned}$$

$$\text{تكون المتتالية } (v_n) \text{ هندسية إذا كان : } \frac{1}{2}\alpha n - n + \alpha - 2 = 0$$

$$\frac{n}{2}(\alpha - 2) + (\alpha - 2) = 0 \text{ ومنه : } \frac{1}{2}\alpha n - n + \alpha - 2 = 0$$

$$\text{ومنه } (\alpha - 2) \left(\frac{n}{2} + 1 \right) = 0 \text{ ومنه } \alpha - 2 = 0 \text{ ومنه : } \alpha = 2$$

تكون المتتالية (v_n) هندسية إذا كان $\alpha = 2$ ويكون حدها الأول

الحل

(1) نعلم إذا كان $f(x) > 0$ لما $x \in [a, b]$ فإن $\int_a^b f(x) dx > 0$

بما أن من أجل كل عدد حقيقي x لدينا $e^{-x+1} > 0$ فإن :

$$\int_n^{n+1} f(x) dx > 0 \text{ ومنه } u_n > 0 \text{ من أجل كل عدد طبيعي } n$$

(2- أ) لدينا $\int e^{ax+b} dx = \frac{1}{a} e^{ax+b} + c$ ومنه

$$u_n = \int_n^{n+1} e^{-x+1} dx = \left[-e^{-x+1} \right]_n^{n+1} = -e^{-(n+1)+1} + e^{-n+1} = -e^{-n} + e^{-n+1} = -e^{-n} + e \times e^{-n} = (e-1)e^{-n}$$

(ب) $u_{n+1} = (e-1)e^{-(n+1)} = e^{-1}(e-1)e^{-n} = e^{-1} \times u_n$

بما أن $u_{n+1} = \frac{1}{e} u_n$ فإن (u_n) متتالية هندسية حدها

الأول $u_0 = e-1$ وأساسها $q = \frac{1}{e}$.

$$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = (e-1) \frac{1-(e^{-1})^{n+1}}{1-e^{-1}} =$$

$$= (e-1) \times \frac{e}{e-1} \times (1-e^{-(n+1)}) = e(1-e^{-(n+1)})$$

$$v_0 = u_0 - 1 = 1 \text{ وأساسها } q = \frac{1}{2}.$$

(2) لما $\alpha = 2$ فالمتتالية (v_n) هندسية ويكون $v_n = v_0 q^n = \frac{1}{2^n}$

لدينا : $v_n = u_n + 2n - 1$ ومنه : $u_n = v_n - 2n + 1$

إذن : $u_n = \frac{1}{2^n} - 2n + 1$

(3) $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n = v_0 \times \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = 2 \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}} \right)$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^{n+1}} = 0$ (لأن $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^{n+1}} = 0$) $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 2 \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}} \right) = 2$

تمرين 36

(u_n) متتالية عددية معرفة كما يلي : $\forall n \in \mathbb{N} : u_n = \int_n^{n+1} e^{-x+1} dx$

(1) أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن : $u_n > 0$

(2- أ) أحسب u_n بدلالة n .

(ب) استنتج أن (u_n) متتالية هندسية يطلب تعيين حدها الأول u_0

وأساسها q . (3) نضع $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

(أ) أحسب S_n بدلالة n . (ب) بين أن $S_n = \int_0^{n+1} e^{-x+1} dx$

الحل

1- أ) تكون (v_n) متتالية هندسية إذا وجد عدد q بحيث $v_{n+1} = v_n q$

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - \frac{2}{\alpha-3} = \frac{3}{\alpha} u_n + \frac{2}{\alpha} - \frac{2}{\alpha-3} = \\ &= \frac{3}{\alpha} u_n + \frac{2(\alpha-3)-2\alpha}{\alpha(\alpha-3)} = \frac{3}{\alpha} u_n - \frac{6}{\alpha(\alpha-3)} = \\ &= \frac{3}{\alpha} \left(u_n - \frac{2}{\alpha-3} \right) = \frac{3}{\alpha} v_n \end{aligned}$$

إذن المتتالية (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{3}{\alpha}$ وحدها الأول

$$v_0 = u_0 - \frac{2}{\alpha-3} = \frac{5}{3} - \frac{2}{\alpha-3} = \frac{5\alpha-21}{3(\alpha-3)}$$

ب) تكون المتتالية الهندسية متقاربة إذا كان $-1 < q < 1$ ومنه (v_n) متقاربة إذا وفقط $-1 < 3/\alpha < 1$ ومنه :

$$-1 < \frac{3}{\alpha} < 1 \text{ يكافئ } \left(\frac{3}{\alpha} < 1 \text{ و } \frac{3}{\alpha} > -1 \right) \text{ أي :}$$

$$\left(\frac{3+\alpha}{\alpha} > 0 \text{ و } \frac{3-\alpha}{\alpha} < 0 \right) \text{ ومنه :}$$

$$\alpha \in]-\infty; 0[\cup]3; +\infty[\text{ و } \alpha \in]-\infty; -3[\cup]0; +\infty[$$

$$\text{إذن : } \alpha \in]-\infty; -3[\cup]3; +\infty[$$

$$\text{ب) } S_n = u_0 + \dots + u_n = \int_0^1 e^{-x+1} dx + \dots + \int_n^{n+1} e^{-x+1} dx$$

نعلم أن إذا كانت الدالة f مستمرة على المجال $[a; k]$ فإن :

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx + \int_c^k f(x) dx = \int_a^k f(x) dx$$

$$S_n = \int_0^1 e^{-x+1} dx + \int_1^2 e^{-x+1} dx + \dots + \int_n^{n+1} e^{-x+1} dx = \int_0^{n+1} e^{-x+1} dx$$

تمرين 37

لتكن المتتالية العددية المعرفة على \mathbb{N} بـ : $u_0 = 5/3$ ومن أجل كل

عدد طبيعي غير معدوم : $u_n = 3u_{n-1} + 2$ حيث $\alpha \in \mathbb{R} - \{0, 3\}$

نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي بـ :

$$v_n = u_n - \frac{2}{\alpha-3} \quad 1- \text{ أ) أثبت أن } (v_n) \text{ متتالية هندسية يطلب}$$

تعيين حدها الأول وأساسها بدلالة α .

ب) عين α حتى تكون (v_n) متقاربة.

نفرض أن $\alpha = 6$. أ) عين عبارة v_n ثم u_n بدلالة n .

ب) أحسب المجموع $S_n = u_0 + \dots + u_n$

ج) أحسب $\pi_n = (v_0 + 1) + (v_1 + 2) + \dots + (v_n + 2^n)$

2- (أ) لما $\alpha = 6$ فإن $v_0 = 1$ و $q = \frac{1}{2}$ إذن : $v_n = v_0 q^n = \frac{1}{2^n}$

لدينا $v_n = u_n - \frac{2}{3}$ ومنه : $u_n = v_n + \frac{2}{3} = \frac{1}{2^n} + \frac{2}{3}$

(ب) $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n =$

$$= \left(v_0 + \frac{2}{3}\right) + \left(v_1 + \frac{2}{3}\right) + \dots + \left(v_n + \frac{2}{3}\right)$$

$$= (v_0 + v_1 + \dots + v_n) + \frac{2}{3}(n+1) = v_0 \frac{1-q^{n+1}}{1-q} + \frac{2}{3}(n+1)$$

$$= 2 \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) + \frac{2}{3}(n+1)$$

→

$$\pi_n = (v_0 + 1) + (v_1 + 2) + (v_2 + 2^2) + \dots + (v_n + 2^n) =$$

$$= (v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n) + (1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^n) =$$

$$= 2 \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) + 2^{n+1} - 1 = 2^{n+1} - \frac{1}{2^n} + 1$$

لأن $1 + 2 + \dots + 2^n = \frac{2^{n+1} - 1}{2 - 1} = 2^{n+1} - 1$ وهي تمثل مجموع

لـ $(n+1)$ حدا متتابعاً لمتتالية هندسية حدها الأول 1 وأساسها 2

تمرين 38

نعتبر المتتاليتين $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ و $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفتين كما يلي :

$$\begin{cases} u_0 = 1, u_1 = 2 \\ 2u_{n+1} - 3u_n + u_{n-1} = 0 \end{cases} \text{ و } v_n = u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n$$

(1) أحسب u_2 و u_3 ثم v_0 و v_1 .

2- (أ) أثبت أن (v_n) ثابتة وحدد قيمة v_n . (ب) استنتج u_{n+1} بدلالة u_n

(3) لتكن المتتالية (p_n) المعرفة على \mathbb{N} بـ : $p_n = u_n - 3$

(أ) بين أن (p_n) هي متتالية هندسية محدداً أساسها وحدها الأول.

(ب) أحسب p_n و u_n بدلالة n . (ج) أحسب بدلالة n كل من :

$$S_2 = u_0 + \dots + u_n, \quad S_1 = p_0 + \dots + p_n$$

$$\pi = p_0 \times \dots \times p_n$$

الحل

(1) لدينا : $2u_{n+1} - 3u_n + u_{n-1} = 0$ ومنه : $u_{n+1} = \frac{3}{2}u_n - \frac{1}{2}u_{n-1}$

$$u_3 = \frac{3}{2}u_2 - \frac{1}{2}u_1 = \frac{11}{4}, \quad u_2 = \frac{3}{2}u_1 - \frac{1}{2}u_0 = \frac{5}{2}$$

$$v_1 = u_2 - \frac{1}{2}u_1 = \frac{3}{2}, \quad v_0 = u_1 - \frac{1}{2}u_0 = \frac{3}{2}$$

$$v_n = u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n = \frac{3}{2}u_n - \frac{1}{2}u_{n-1} - \frac{1}{2}u_n = u_n - \frac{1}{2}u_{n-1} = v_{n-1}$$

(2) أ- بما أن من أجل كل عدد طبيعي n لدينا $v_n = v_{n-1}$ فالمتتالية

(v_n) ثابتة

$$= p_0^{n+1} \times q^{1+2+\dots+n} = (p_0)^{n+1} \times q^{\frac{n(n+1)}{2}} = (-2)^{n+1} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{n(n+1)}{2}}$$

تمرين 39

لتكن المتتالية (v_n) المعرفة على \mathbb{N} كمايلي : $v_1 = \alpha$ ومن أجل كل عدد طبيعي n بالعلاقة التراجعية : $3v_{n+1} - 2v_n = 3$.

(1) أحسب v_2, v_3, v_4 بدلالة α

(2) نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة على \mathbb{N}^* بـ : $u_n = v_n - 3$

(أ) أحسب u_1 وبين أن $3u_{n+1} - 2u_n = 0$. ماذا نستنتج ؟

(ب) أحسب u_n ثم v_n بدلالة α و n .

(3) أحسب $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$ ، $S'_n = v_1 + v_2 + \dots + v_n$

(4) $(p_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ متتالية عددية معرفة بـ : $p_n = v_n + \alpha$

(أ) عين العدد الحقيقي α حتى تكون (p_n) متتالية هندسية .

(ب) نفرض أن $\alpha = -3$. أحسب : $\pi_n = u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2$

الحل

(1) لدينا $3v_{n+1} - 2v_n = 3$ ومنه : $v_{n+1} = \frac{2}{3}v_n + 1$ إذن :

$$v_4 = \frac{8}{27}\alpha + \frac{19}{9} , \quad v_3 = \frac{4}{9}\alpha + \frac{5}{3} , \quad v_2 = \frac{2}{3}\alpha + 1$$

$$u_1 = v_1 - 3 = \alpha - 3 \quad (2-أ)$$

ومنه $v_0 = v_1 = \dots = v_n = \frac{3}{2}$ لدينا (ب) $v_n = u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n$

ومنه : $u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n = \frac{3}{2}$ معناه : $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + \frac{3}{2}$

3- (أ) تكون (p_n) متتالية هندسية إذا وجد عدد q بحيث $p_{n+1} = p_n q$

$$p_{n+1} = u_{n+1} - 3 = \frac{1}{2}u_n + \frac{3}{2} - 3 = \frac{1}{2}(u_n - 3) = \frac{1}{2}p_n$$

بما أن $p_{n+1} = \frac{1}{2}p_n$ فالمتتالية (p_n) هي هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها

الأول $p_0 = -2$. (ب) $p_n = p_0 \times q^n = -2 \times \frac{1}{2^n} = -\frac{1}{2^{n-1}}$

لدينا $p_n = u_n - 3$ ومنه : $u_n = p_n + 3 = -\frac{1}{2^{n-1}} + 3$

$$S_1 = p_0 + \dots + p_n = p_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = -4 \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) \quad (\rightarrow)$$

$$S_2 = u_0 + \dots + u_n = (p_0 + 3) + \dots + (p_n + 3) =$$

$$= (p_0 + \dots + p_n) + 3(n+1) = -4 \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) + 3(n+1)$$

$$\pi = p_0 \times p_1 \times \dots \times p_n =$$

$$= p_0 \times (p_0 q) \times \dots \times (p_0 q^n) = (p_0)^{n+1} \times q \times q^2 \times \dots \times q^n =$$

4) تكون المتتالية (p_n) هندسية إذا وجد عدد q بحيث $p_{n+1} = p_n \times q$

$$p_{n+1} = v_{n+1} + \alpha = \frac{2}{3}v_n + 1 + \alpha = \frac{2}{3}(v_n + \alpha) + \frac{1}{3}\alpha + 1 = \frac{2}{3}p_n + \left(\frac{1}{3}\alpha + 1\right)$$

تكون (p_n) متتالية هندسية إذا كان $\frac{1}{3}\alpha + 1 = 0$ أي $\alpha = -3$

من أجل $\alpha = -3$ المتتالية (p_n) هندسية أساسها $\frac{2}{3}$ وحدها

$$p_1 = v_1 + \alpha = 2\alpha = -6 \text{ الأول}$$

$$\pi_n = u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2 = u_1^2 + (u_1q)^2 + \dots + (u_1q^{n-1})^2 = u_1^2(1 + q^2 + q^4 + \dots + q^{2(n-1)})$$

$$= 36 \left(1 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^4 + \dots + \left(\frac{2}{3}\right)^{2(n-1)} \right)$$

$$\left(1 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^4 + \dots + \left(\frac{2}{3}\right)^{2(n-1)} \right)$$

هو مجموع لـ n حدا متتبعاً لمتتالية هندسية حدها الأول 1

$$\text{وأساسها } \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} \text{ إذن:}$$

لدينا : $u_{n+1} = v_{n+1} - 3$ و $v_{n+1} = \frac{2}{3}v_n + 1$ ومنه :

$$3u_{n+1} - 2u_n = 3(v_{n+1} - 3) - 2(v_n - 3) = 3\left(\frac{2}{3}v_n - 2\right) - 2v_n + 6 = 2v_n - 6 - 2v_n + 6 = 0$$

بما أن $3u_{n+1} - 2u_n = 0$ أي $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n$ فالمتتالية (u_n)

هندسية حدها الأول u_1 وأساسها $q = \frac{2}{3}$

$$u_n = v_n - 3 \text{ لدينا } u_n = u_1q^{n-1} = (\alpha - 3) \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \text{ ب-}$$

$$v_n = u_n + 3 = (\alpha - 3) \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} + 3 \text{ ومنه :}$$

$$S_n = u_1 + \dots + u_n = u_1 \frac{1 - q^n}{1 - q} = \quad (3)$$

$$= 3(\alpha - 3) \times \left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n \right]$$

$$S'_n = v_1 + \dots + v_n = (u_1 + 3) + \dots + (u_n + 3) =$$

$$= (u_1 + u_2 + \dots + u_n) + 3n = S_n + 3n =$$

$$= 3(\alpha - 3) \times \left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n \right] + 3n$$

الحل

(1) تكون المتتالية (v_n) ثابتة إذا كان من أجل كل عدد طبيعي n يكون لدينا : $v_{n+1} = v_n$. إذا كان $a = 2$ فإن :

$$v_{n+1} = u_{n+2} - u_{n+1} = \frac{1}{2}a^2 u_{n+1} + (a-3)u_n - u_{n+1} =$$

$$= \frac{1}{2}(2)^2 u_{n+1} + (2-3)u_n - u_{n+1} = u_{n+1} - u_n = v_n$$

بما أن من أجل كل عدد طبيعي n لدينا $v_{n+1} = v_n$ فالمتتالية (v_n) هي متتالية ثابتة $v_n = v_0 = u_1 - u_0 = 2$

(ب) لدينا $u_{n+1} - u_n = v_n = 2$ حسب التعريف فالمتتالية (u_n) هي متتالية حسابية حدها الأول $u_0 = 1$ واساسها 2.

(ج) $u_n = u_0 + nr = 1 + 2n$.

(د) لدينا $u_n = 1 + 2n$ وهو يمثل عدد فردي ؛

$u_0 = 1, u_1 = 3, u_2 = 5, \dots, u_n = 1 + 2n$ نلاحظ أن

حدود (u_n) هي الأعداد الطبيعية الفردية والمتتابعة

نعلم أن $u_{49} = 1 + 2 \times 49 = 99$ ، ويكون مجموع الأعداد الفردية الأصغر من 100 هو :

$$1 + 3 + \dots + 99 = u_0 + u_1 + \dots + u_{49} = (u_0 + u_{49}) \times \frac{50}{2} =$$

$$= (1 + 99) \times 25 = 100 \times 25 = 2500$$

2- (أ) إذا كان $a = -4$ فإن : $u_{n+2} = 8u_{n+1} - 7u_n$

$$1 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \dots + \left(\frac{2}{3}\right)^{2(n-1)} = \frac{1 - \left(\frac{4}{9}\right)^n}{1 - \frac{4}{9}} = \frac{9}{5} \left[1 - \left(\frac{4}{9}\right)^n\right]$$

إذن : $\pi_n = 36 \times \frac{9}{5} \left[1 - \left(\frac{4}{9}\right)^n\right]$

تمرين 40

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بـ : $u_0 = 1$ و من أجل كل عدد طبيعي n

بـ : $u_{n+2} = \frac{1}{2}a^2 u_{n+1} + (a-3)u_n$ حيث a عدد حقيقي .

لتكن المتتالية (v_n) المعرفة على \mathbb{N} بـ : $v_n = u_{n+1} - u_n$.
(1) نضع $a = 2$.

(أ) تحقق بأن المتتالية (v_n) ثابتة .

(ب) استنتج أن (u_n) متتالية حسابية يطلب تعيين اساسها وحدها لأول.

(ج) عبر بدلالة n عن u_n و $S_n = u_0 + \dots + u_n$.

(د) استنتج مجموع الأعداد الفردية الأصغر من 100

(2) نضع $a = -4$

(أ) برهن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب إعطاء حدها العام

(ب) أحسب $S'_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$

(ج) برهن أن $S'_n = u_{n+1} - 1$ واستنتج أن المتتالية (u_n) متباعدة .

تمارين مرفقة بالنتائج

تمرين 01

a, b, c ثلاثة حدود متتابعة من متتالية حسابية حيث:

$$a^3 + b^3 + c^3 = 153, \quad a + b + c = 9$$

(1) احسب a, b, c (2) نفرض أن الحد الأول لهذه المتتالية الحسابية هو $a = 1$. - احسب S مجموع n حد الأولى لهذه المتتالية.

- النتائج:

(1) $(a; b; c) = (1; 3; 5)$ أو $(a; b; c) = (5; 3; 1)$.

(2) إذا كان $a = 1$ فإن $r = 2$ ومنه الحد الذي مرتبته n هو:

$$S = \frac{(1 + 2n - 1)}{2} \times n = n^2 \text{ إذن } a + (n - 1)r = 2n - 1$$

تمرين 02

نعتبر المتتالية الهندسية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^+}$ ذات الأساس الموجب و حدها

الأول $u_1 = \frac{1}{2}$ و $81u_{10} = 16u_6$ (1) احسب أساس هذه المتتالية.

(2) احسب: $S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n$ (3) احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

- النتائج:

(1) الأساس q للمتتالية هو $q = \frac{2}{3}$ (2) $S_n = \frac{2}{3} \left[1 - \left(\frac{2}{3} \right)^n \right]$

تكون (v_n) متتالية هندسية إذا وجد عدد q بحيث $v_{n+1} = v_n q$

$$v_{n+1} = u_{n+2} - u_{n+1} = 8u_{n+1} - 7u_n - u_{n+1} = 7(u_{n+1} - u_n) = 7v_n$$

بما أن $v_{n+1} = 7v_n$ فالمتتالية (v_n) هي متتالية هندسية أساسها 7

وحدها الأول $v_0 = u_1 - u_0 = 2$ وحدها العام $v_n = v_0 q^n = 2 \times 7^n$

$$S'_n = v_0 + \dots + v_n = 2 \times \frac{7^{n+1} - 1}{7 - 1} = \frac{1}{3} (7^{n+1} - 1) \quad \text{ب)}$$

ج) ولدينا أيضا:

$$S'_n = (u_1 - u_0) + (u_2 - u_1) + \dots + (u_{n+1} - u_n) = u_{n+1} - u_0 = u_{n+1} - 1$$

لدينا: $S'_n = u_{n+1} - 1$ ومنه:

$$u_{n+1} = S'_n + 1 = \frac{1}{3} (7^{n+1} - 1) + 1$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{3} (7^n - 1) + 1 = +\infty \quad \text{بما أن:}$$

فإن المتتالية (u_n) متباعدة.



$$(3) \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{3}{2}$$

تمرين 03

(1) عين عددين حقيقيين موجبين a و b بحيث : a ، $(6a - b)$ ، $(a + 2b)$ تكون الثلاثة حدود الأولى u_0 ، u_1 ، u_2 لمتتالية حسابية (u_n) و a ، $(b + 1)$ ، $(4b - a)$ تكون الثلاثة حدود الأولى لمتتالية هندسية (v_n) . (2) عبر عن u_n و v_n بدلالة n .

- النتائج :

$$(1) a = 2 \text{ و } b = 5 \quad (2) u_n = 2 + 5n \text{ و } v_n = 2 \times 3^n$$

تمرين 04

نعتبر المتتالية الهندسية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة بـ $u_0 = 3$ والعلاقة

$$u_{n+1} = \frac{4u_n - 2}{u_n + 1} \text{ من أجل كل عدد طبيعي } n.$$

(1) برهن أن $u_n \neq 1$ من أجل كل عدد طبيعي n . (2) لتكن المتتالية

$$(v_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ المعرفة بالعلاقة } v_n = \frac{u_n - 2}{u_n - 1} \text{ من أجل كل عدد طبيعي } n$$

برهن أن $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ هي متتالية هندسية يطلب تعيين حدها الأول و أساسها. (3) عبر عن v_n بدلالة n .

$$(4) \text{ أ- احسب } \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n \quad \text{ ب- ما هي نهاية } u_n \text{ لما } n \rightarrow +\infty.$$

- النتائج :

(1) نستعمل البرهان بالتراجع. (2) $v_{n+1} = \frac{2}{3} \cdot v_n$ إذن (v_n) هي

متتالية هندسية حدها الأول $v_0 = \frac{1}{2}$ و أساسها $\frac{2}{3}$.

$$(3) v_n = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n \quad (4) \text{ أ- } \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0 \quad \text{ ب- } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

تمرين 05

لتكن المتتالية (u_n) المعرفة بـ $u_1 = \frac{1}{2}$ و $u_{n+1} = \frac{1}{2}(u_n^2 + 1)$ من

أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n .

(1) احسب u_2 ، u_3 ، u_4 ، u_5 . (2) برهن أن (u_n) متزايدة.

(3) برهن بأن $0 < u_n \leq 1$ مهما يكن العدد الطبيعي غير المعدوم n ، ثم استنتج أن (u_n) متقاربة و احسب نهايتها.

- النتائج :

$$(1) u_2 = 0,62 \quad , \quad u_3 = 0,69 \quad , \quad u_4 = 0,74 \quad , \quad u_5 = 0,77$$

$$(2) u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n - 1)^2}{2} \geq 0 \text{ ومنه : } (u_n) \text{ متزايدة.}$$

(3) نستعمل البرهان بالتراجع : لدينا $0 < u_n \leq 1$ ومنه

$$0 < u_n^2 \leq 1 \quad \text{ومنه} \quad 1 < u_n^2 + 1 \leq 2 \quad \text{ومنه} :$$

$\frac{1}{2} < \frac{1}{2}(u_n^2 + 1) \leq 1$. بما أن (u_n) متزايدة و محدودة من الأعلى فهي متقاربة .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

تمرين 06

(I) لتكن المتتالية (u_n) معرفة بـ : u_0 و u_1 و علاقة التراجع :

$$(1) \dots u_{n+2} = \frac{2}{5}u_{n+1} + \frac{3}{5}u_n \quad \text{من أجل كل عدد طبيعي } n.$$

(1) برهن أن المتتالية (v_n) المعرفة بـ : $v_n = u_{n+1} - u_n$ هي متتالية هندسية . (2) احسب v_n بدلالة n ، u_0 ، u_1 واستنتج u_n بدلالة n ، u_0 ، u_1 . (3) احسب : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

(II) نعتبر المتتالية (w_n) المعرفة بـ w_0 و w_1 حيث w_0 و w_1

عديدين موجبيين تماما و $w_{n+2} = \sqrt[5]{(w_{n+1})^2 \cdot (w_n)^3}$ من أجل كل عدد طبيعي n .

(1) برهن أن المتتالية (t_n) المعرفة بـ :

$$t_n = \ln w_n \quad \text{تحقق العلاقة (1) .} \quad (2) \quad \text{استنتج} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} t_n$$

- النتائج :

$$(I) \quad v_{n+1} = -\frac{3}{5}v_n \quad \text{إذن} \quad (v_n) \text{ متتالية هندسية ذات الأساس } -\frac{3}{5} .$$

$$v_n = (u_1 - u_0) \left(-\frac{3}{5}\right)^n \quad (2)$$

$$u_n = \frac{5u_1 + 3u_0}{8} - \frac{5}{8}(u_1 - u_0) \left(-\frac{3}{5}\right)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{5u_1 + 3u_0}{8} \quad (3)$$

$$t_{n+2} = \ln w_{n+2} = \frac{1}{5}(2 \ln w_{n+1} + 3 \ln w_n) \quad (II)$$

$$\text{ومنه} : t_{n+2} = \frac{2}{5}t_{n+1} + \frac{3}{5}t_n$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} t_n = \frac{5t_1 + 3t_0}{8} = \frac{5 \ln w_1 + 3 \ln w_0}{8} \quad (2)$$

تمرين 07

لتكن المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة بـ $u_0 = 2$

$$u_n = \frac{2 + u_{n-1}}{1 + 2u_{n-1}} \quad \text{من أجل } n \geq 1$$

(1) برهن أن $u_n \neq -1$ من أجل كل عدد طبيعي n . (2) نعتبر المتتالية

$$(v_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ المعرفة بـ } v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 1} . \quad \text{أكتب } v_n \text{ بدلالة } v_{n-1}$$

واستنتج عبارة v_n ثم u_n بدلالة n . (3) احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ ، $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$

- النتائج:

(1) نستعمل البرهان بالتراجع .

$$v_n = -\frac{1}{3}v_{n-1} \quad , \quad v_n = \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

$$u_n = -1 + \frac{2}{1 + \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1}}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1 \quad , \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0 \quad (3)$$

تمرين 08

نعتبر المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة بـ u_0 و u_1 و علاقة التراجع

$$u_n = 6u_{n-1} - 9u_{n-2} \quad \text{من أجل كل عدد طبيعي } n \geq 2.$$

(1) لتكن المتتالية $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة بـ $v_n = 3^n \cdot u_n$.

أ - احسب : $v_n - v_{n-1}$ بدلالة $v_{n-1} - v_{n-2}$ واستنتج عبارة

$v_n - v_{n-1}$ بدلالة v_0 و v_1 . ب - احسب v_n بدلالة u_0 و u_1 و n

(2) نضع $u_0 = \frac{1}{3}$ و $u_1 = 1$. أ - ماذا نقول عن المتتاليتين

(u_n) و (v_n) . ب - احسب $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$ و $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$

- النتائج:

$$(1) \quad v_n - v_{n-1} = v_{n-1} - v_{n-2} = v_1 - v_0$$

ب - $v_n = \frac{n}{3}u_1 - (n-1)u_0$ (2) ، أ - $v_n = \frac{1}{3}$ المتتالية (v_n) ثابتة

$u_n = 3^{n-1}$ المتتالية (u_n) هي متتالية هندسية أساسها 3 .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty \quad , \quad S_n = \frac{1}{3} - \frac{1-3^n}{2} \quad \text{ب -}$$

تمرين 09

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بـ $u_n = an + b$ حيث n عدد طبيعي

و a ، b عدنان حقيقيان . (1) برهن بأن (u_n) متتالية حسابية يطلب

تعيين حدها الأول u_0 و أساسها r .

(2) احسب : $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$ بدلالة a ، b ، n .

(3) نفرض أن a عدد حقيقي غير معدوم و نعتبر المتتالية (v_n)

المعرفة بـ : $v_n = 3^{u_n}$ من أجل كل عدد n من \mathbb{N} . أ - برهن أن (v_n)

هي متتالية هندسية يطلب تعيين حدها الأول v_0 و أساسها q .

ب - عين المجال الذي تنتمي إليه a حتى تكون المتتالية (v_n)

متقاربة ، ثم احسب $S'_n = v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n$ بدلالة

a ، b ، n . (4) عين a و b علما أن $v_0 = 81$ و $S_9 = -5$.

احسب في هذه الحالة أصغر قيمة n_0 للعدد n بحيث $v_n < 10^{-5}$.

- النتائج:

$$(1) \quad u_{n+1} - u_n = a \text{ فالتتالية } (u_n) \text{ حسابية أساسها } a \text{ و حدها الأول}$$

$$(2) \quad u_0 = b \quad S_n = \frac{1}{2}(n+1)(an+2b)$$

$$(3) \quad \frac{v_{n+1}}{v_n} = 3^a \text{ إذن التتالية } (v_n) \text{ هي متتالية هندسية أساسها}$$

$$q = 3^a \text{ و حدها الأول } v_0 = 3^b \text{ . ب- تكون التتالية } (v_n) \text{ متقاربة}$$

$$\text{لما } a \in]-\infty; 0] \text{ ، } S'_n = \boxed{3^b \cdot \frac{1-3^{(n+1)a}}{1-3^a}}$$

$$(4) \quad a = -1 \text{ ، } b = 4 \text{ ، } n_0 = 15$$

تمرين 10

نعتبر التتالية (u_n) المعرفة بحددها الأول u_0 ،

$$u_n = 3u_{n-1} + 2 \text{ حيث } n \text{ عدد طبيعي غير معدوم. ليكن}$$

$$a \text{ عدد حقيقي ، من أجل كل عدد طبيعي } n \text{ نضع } v_n = u_n + a$$

(1) احسب a حتى تصبح التتالية ذات الحد العام v_n متتالية هندسية

أساسها 3 ، واستنتج عبارة u_n بدلالة u_0 و n . (2) عين قيمة u_0

حتى تكون التتالية (u_n) ثابتة. (3) نفرض أن $a = 1$ و $u_0 = 1$.

أ- احسب بدلالة n المجموع $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$.

ب- عين أصغر قيمة n_0 للعدد n حتى تكون $S_n > 10^4$.

- النتائج:

$$(1) \quad a = 1 \text{ ، } u_n = 3^n(u_0 + 1) - 1$$

$$(2) \quad \text{تكون } (u_n) \text{ ثابتة إذا كان } u_0 = -1 \text{ . (3) } S_n = 3^{n+1} - 1$$

$$\text{ب- لدينا } 3^9 = 19683 \text{ و } 3^8 = 6561 \text{ إذن } n_0 = 8$$

تمرين 11

لتكن التتالية الهندسية (u_n) ذات الأساس q الموجب تماما .

$$(1) \quad \text{أ- عين } q \text{ علما أن } 625u_{12} = 16u_8 \text{ . ب- نرسم } S_n \text{ إلى}$$

$$\text{المجموع } \sum_{K=1}^n u_K = u_1 + u_2 + \dots + u_n \text{ ، عبر عن } S_n \text{ بدلالة } u_1 \text{ و } n$$

$$\text{ج- عين } u_1 \text{ علما أن } \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 1$$

(2) نفرض أن التتالية (u_n) تحقق شروط السؤال الأول (1) و نعتبر

$$\text{التتالية } (v_n) \text{ المعرفة بحددها العام } v_n = 5u_n - 3$$

أ- عبر عن v_n بدلالة n . ب- هل التتالية (v_n) متقاربة ؟

- النتائج:

$$(1) \quad \text{أ- } q = \frac{2}{5} \text{ . ب- } S_n = \frac{5u_1}{3} \left[1 - \left(\frac{2}{5} \right)^n \right] \text{ ، ج- } u_1 = \frac{3}{5}$$

$$(2) \quad \text{أ- } v_n = 3 \left[\left(\frac{2}{5} \right)^{n-1} - 1 \right] \text{ . ب- } \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -3 \text{ إذن } (v_n)$$

متتالية متقاربة.

تمرين 12

لتكن المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة بـ : $u_0 = \frac{1}{2}$ ، $u_n = \frac{3u_{n-1}}{u_{n-1} + 1}$.

و نعتبر المتتالية $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة بـ : $v_n = 1 - \frac{1}{u_n}$.

الطبيعي n . (1) برهن أن (v_n) هي متتالية هندسية يطلب تعيين حدها الأول و أساسها . (2) احسب : $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$.

(3) احسب u_n بدلالة n و استنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ لما $n \rightarrow +\infty$.

- النتائج :

(1) $v_{n+1} = \frac{1}{3}v_n$ ومنه (v_n) هي متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{3}$ وحدها

الأول $v_0 = -1$. (2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$.

(3) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$ ، $u_n = \frac{1}{1 + 3^{-n}}$.

تمرين 13

استهلاك القمح في الجزائر يزداد كل عام بـ 10% . ليكن $f(0)$ الكمية من القمح المستهلكة حاليا و $f(n)$ الكمية من القمح المستهلكة في سنة n (عدد طبيعي) . (1) أوجد العلاقة بين $f(n)$ و $f(n+1)$ ، ثم عبر عن $f(n)$ بدلالة $f(0)$ و n . (2) في كم سنة يكون استهلاك الجزائر ضعف الاستهلاك الحالي؟

(3) إذا كان في هذه السنة الاستهلاك بلغ 10^6 (tonnes) ، فما هي كمية القمح المستهلكة بعد 20 سنة؟

- النتائج :

(1) $f(n+1) = \frac{11}{10}f(n)$ ، المتتالية $f(n)$ هندسية أساسها 1,1

ومنه $f(n) = f(0) \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^n$. (2) $f(n) = 2f(0)$ ومنه :

$\left(\frac{11}{10}\right)^n = 2$ ومنه $n = 7$. (3) الكمية المستهلكة في 20 سنة هي :

$f(20)$ ومنه : $f(20) = f(0) \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^{20}$ ومنه :

$$f(20) = 10^6 \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^{20} = \boxed{6,72 \times 10^6 \text{ (tonnes)}}$$

تمرين 14

نعتبر المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة بـ : $u_1 = 1$ ، $(u_{n+1})^2 = 4u_n$.

(1) احسب u_2 ، u_3 ، u_4 ، u_5 و أعط النتائج على الشكل 2^a .

(2) نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة بـ $v_n = \ln u_n - \ln 4$. برهن أن

(v_n) هي متتالية هندسية يطلب تعيين حدها الأول و أساسها .

(3) عبر عن v_n بدلالة n و استنتج u_n . احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

(4) عين قيم n التي من أجلها يكون $u_n > 3,96$.

- النتائج:

$$(1) \quad u_5 = 2^{\frac{15}{8}}, \quad u_4 = 2^{\frac{7}{4}}, \quad u_3 = 2^{\frac{3}{2}}, \quad u_2 = 2$$

$$(2) \quad v_{n+1} = \ln\left(\frac{u_{n+1}}{4}\right) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{u_n}{4}\right) = \frac{1}{2} v_n \quad \text{ومنه } (v_n) \text{ متتالية}$$

هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها الأول $v_1 = -2\ln 2$.

$$(3) \quad \ln u_n = v_n + \ln 4, \quad v_n = v_1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = -\frac{\ln 2}{2^{n-2}} \quad \text{ومنه:}$$

$$u_n = 4e^{-\frac{\ln 2}{2^{n-2}}} \quad \text{و} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4$$

(4) يكون $u_n > 3,96$ إذا كان $n \geq 9$.

تمرين 15

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بـ: $u_0 = -1$ و من أجل كل عدد

$$\text{طبيعي } n \quad u_{n+1} = \frac{3+2u_n}{2+u_n} \quad (1) \quad \text{احسب } u_1, u_2, u_3.$$

(2) برهن أن $u_n > 0$ من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n .

(3) برهن أن (u_n) محدودة من الأعلى بالعدد $\sqrt{3}$.

(4) عين اتجاه تغيرات المتتالية (u_n) . (5) نعتبر المتتالية

$$(v_n) \text{ المعرفة بـ: } v_n = \frac{u_n - \sqrt{3}}{u_n + \sqrt{3}}, \quad \text{من أجل كل عدد طبيعي } n.$$

أ- برهن أن (v_n) هي متتالية هندسية يطلب تعيين حدها الأول v_0

و أساسها. ب- احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ ، $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

- النتائج:

$$(1) \quad u_3 = \frac{19}{11}, \quad u_2 = \frac{5}{3}, \quad u_1 = 1 \quad (2) \quad \text{نستعمل البرهان بالتراجع}$$

لنبرهن أن $u_n > 0$. (3) نستعمل البرهان بالتراجع لنبرهن أن

$$u_n < \sqrt{3} \quad \text{من أجل كل عدد طبيعي } n.$$

$$(4) \quad u_{n+1} - u_n = \frac{(\sqrt{3} + u_n)(\sqrt{3} - u_n)}{2 + u_n} \quad \text{ونعلم أن } u_n > 0$$

و $u_n < \sqrt{3}$ (السؤالين 2 و 3) إذن $u_{n+1} - u_n > 0$ ومنه (u_n)

متتالية متزايدة. (5) أ- $v_{n+1} = (2 - \sqrt{3})^2 \times v_n$ ومنه (v_n) متتالية

$$\text{هندسية أساسها } (2 - \sqrt{3})^2 \quad \text{وحدها الأول } v_0 = -\frac{(1 + \sqrt{3})^2}{2}$$

$$\text{ب- } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{3}, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$$

تمرين 16

(u_n) متتالية حسابية متناقصة أساسها r وحدها الأول u_0 حيث :

$$u_1 + u_2 + u_3 = 18 \quad \text{و} \quad u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 = 116$$

(1) أ- عين الحد الأول u_0 و الأساس r لهذه المتتالية .

ب- استنتج عبارة u_n بدلالة n . (2) نعتبر المتتالية $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$

المعرفة بـ $v_n = e^{u_n}$. e هو أساس اللوغارتم النبيري :

أ- برهن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين

أساسها وحدها الأول v_0 . ب- نضع $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_{n-1}$

$$\text{و} \quad S'_n = v_0 \times v_1 \times \dots \times v_{n-1}$$

- احسب S_n و S'_n ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n$

- النتائج :

(1) أ- $u_0 = 10$ و $r = -2$. ب- $u_n = 10 - 2n$

(2) أ- $v_{n+1} = \frac{1}{e^2} \times v_n$ ومنه المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{e^2}$

وحدها الأول $v_0 = e^{10}$. ب- $S_n = \frac{1 - e^{-2n}}{e^2 - 1} \times e^{12}$

$$\text{و} \quad S'_n = e^{-n^2 + 11n} \quad , \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n = 0$$

تمرين 17

لتكن المتتالية ذات الحد العام و المعرفة بـ $u_n = 2^n - 5n + 6$

من أجل كل عدد طبيعي n . (1) احسب u_0, u_1, u_2, u_3 . (2) نعتبر

المتتاليتين $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ و $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ و المعرفتين بـ : $w_n = 5n - 6$

و $v_n = 2^n$. أ- برهن أن (v_n) هي متتالية هندسية يطلب تعيين

وحدها الأول v_0 و أساسها q . ب- برهن أن (v_n) متباعدة .

ج- برهن أن (w_n) هي متتالية حسابية يطلب تعيين حدها

الأول w_0 و أساسها r .

(3) نضع : $S'_n = v_0 \times v_1 \times \dots \times v_{n-1}$ ، $S''_n = w_0 + w_1 + \dots + w_n$

$$\text{و} \quad S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$$

- احسب S'_n و S''_n و S_n بدلالة n ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n$ ، $\lim_{n \rightarrow +\infty} S''_n$

- النتائج :

(1) $u_0 = 7$ ، $u_1 = 3$ ، $u_2 = 0$ ، $u_3 = -1$. (2) أ- لدينا :

$v_{n+1} = 2^{n+1} = 2^n \times 2 = 2 \times v_n$ ومنه (v_n) متتالية هندسية

أساسها 2 وحدها الأول $v_0 = 1$. ب- $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$ ومنه :

(v_n) هي متتالية متباعدة . ج- $w_{n+1} - w_n = 5$ ومنه (w_n) هي

متتالية حسابية أساسها $r = 5$ وحدها الأول $w_0 = -6$.

$$S_n'' = \frac{n+1}{2} \times (5n-12) \text{ و } S_n' = 2^{n+1} - 1 \quad (3)$$

$$S_n = S_n' - S_n'' = 2^{n+1} - 1 - \frac{n+1}{2}(5n-12)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n' = +\infty , \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n'' = +\infty$$

تمرين 18

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متتالية هندسية موجبة حيث : $u_1 \times u_3 = 64$

و $5u_1 + u_2 = 88$ (1) عين u_1, u_2, u_3 وأساس المتتالية .

2- (أ) عبر عن u_n بدلالة n . (ب) احسب $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1}$

(3) عين الحد الذي نبدأ منه بحيث يكون مجموع 5 حدود متتابة

من (u_n) يساوي $\frac{31}{16}$. (4) نعتبر المتتالية (α_n) المعرفة بـ :

$$\alpha_0 = \frac{1}{2} \text{ و } \alpha_n = \frac{1}{n^2 + 3n + 2} \text{ مهما يكن العدد الطبيعي } n .$$

أ- عين العددين الحقيقيين γ و β حيث $\alpha_n = \frac{\gamma}{n+1} + \frac{\beta}{n+2}$

ب- احسب $S' = \alpha_0 + \alpha_{10} + \dots + \alpha_{n-1}$

- النتائج :

(1) $u_1 = 16, u_2 = 8, u_3 = 4$. أساس المتتالية (u_n) هو $\frac{1}{2}$

$$(2) \quad u_n = 32 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad \text{ب} \quad S_n = 64 \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right]$$

(3) الحد الذي نبدأ منه هو $u_5 = 1$ (4) $\beta = -1, \gamma = 1$

$$\text{ب} \quad S' = \alpha_0 + \alpha_{10} + \dots + \alpha_{n-1} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

تمرين 19

نعرف المتتالية (v_n) بـ : $v_1 = 20, v_3 = 10$ و

$$v_{n+1} - 2v_n + v_{n-1} = 0 \text{ من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم } n .$$

(1) اثبت أن (v_n) متتالية حسابية يطلب تعيين حدها الأول v_0

وأساسها r . (2) عين عبارة الحد العام v_n بدلالة n ثم احسب :

$$S_n = v_2 + v_3 + \dots + v_{n-3} \quad (3) \text{ عين العدد الطبيعي } n \text{ حتى يكون}$$

$$S_n = 15 \quad (4) \text{ نعتبر المتتالية } (u_n) \text{ المعرفة بـ : } u_n = 2^{v_n + 6n - 24} \text{ من}$$

أجل كل عدد طبيعي n . (أ) برهن أن المتتالية (u_n) هندسية يطلب

تعيين حدها الأول وأساسها q .

$$\text{ب) احسب : } P = u_0 \times u_1 \times \dots \times u_{n-1}$$

$$\text{و } S'_n = u_0 + \left(\frac{1}{2}\right)u_1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 u_2 + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^n u_n$$

- النتائج :

(1) $v_{n+1} - v_n = v_n - v_{n-1}$ ومنه المتتالية (v_n) متتالية حسابية

أساسها $r = -5$ و حدها الأول $v_0 = v_1 - r = 25$.

$$S_n = (55 - 5n) \left(\frac{n-4}{2} \right) , \quad v_n = 25 - 5n \quad (2)$$

$$(3) \quad S_n = 15 \text{ إذا كان } n = 10 . \quad (4) \quad u_n = 2^{n+1} \text{ و } \frac{u_n}{u_{n-1}} = 2$$

إن (u_n) متتالية هندسية أساسها $q = 2$ و حدها الأول $u_0 = 2$.

$$\text{ب-} \quad P = \frac{n}{2}(n+1) , \quad S'_n = 2(n+1)$$

تمرين 20

$$(v_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ متتالية هندسية حدودها أعداد طبيعية حيث } v_0 \text{ أولي مع } 5$$

و $v_0 + v_2 = 55$ (1) احسب v_0, v_1, v_2 . (2-أ) عبر عن v_n بدلالة n .

$$\text{ب-} \quad S_n = v_4 + v_5 + \dots + v_{n+7} \text{ احسب :}$$

$$(3) \quad \text{عين العدد الطبيعي } n \text{ حيث : } S_n - 2^{6n+2} + 3 \equiv 0 [7]$$

$$(4) \quad \text{نعتبر المتتالية } (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ حيث : } v_n = u_n - 2n - 1$$

$$\text{احسب : } S'_n = u_4 + u_5 + \dots + u_{n+7}$$

- النتائج :

$$(1) \quad v_0 = 11 , v_1 = 22 , v_2 = 44 \quad (2) \quad v_n = 11 \times 2^n$$

$$\text{ب-} \quad S_n = 176(2^{n+4} - 1) \quad (3) \quad S_n - 2^{6+2} + 3 \equiv 0 [7] \text{ إذا كان}$$

$$n = 3k \text{ مع } k \in \mathbb{N}$$

$$(4) \quad S'_n = 176(2^{n+4} - 1) + (n+12)(n+4)$$

تمرين 21

$$(1) \quad a, b, c \text{ أعداد طبيعية بهذا الترتيب تشكل متتالية حسابية متزايدة. عين أ، ب، ج علما أن } a + c = 30$$

$$PPCM(a, c) = 24 \text{ (المضاعف المشترك الأصغر)}$$

$$\text{و } PGCD(a, b) = 6 \text{ (القاسم المشترك الأكبر).}$$

$$(2) \quad \text{نعتبر المتتالية } (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ المعرفة بحددها العام } u_n = 6 + 9n$$

$$\text{أ- احسب } u_0, u_1, u_2 . \text{ ب- برهن أن } (u_n) \text{ متتالية حسابية يطلب}$$

$$\text{تعيين أساسها و حدها الأول. ج- عين رتبة الحد الذي قيمته 96.}$$

$$(3) \quad \text{أ- احسب : } S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1}$$

$$\text{و } \pi_n = e^{u_0} \times e^{u_1} \times \dots \times e^{u_{n-1}}$$

$$\text{ب- عين العدد الطبيعي } n \text{ حتى يكون } \ln \pi_n = 465$$

- النتائج :

$$(1) \quad a = 6 , b = 15 , c = 24 . \quad (2) \quad u_0 = 6 , u_1 = 15 , u_2 = 24$$

$$\text{ب-} \quad u_{n+1} - u_n = 9 \text{ فالمتتالية } (u_n) \text{ حسابية أساسها } r = 9$$

$$\text{و حدها الأول } u_0 = 6 . \quad \text{ج- رتبة الحد الذي قيمته 96 هي 11}$$

$$\text{و هو الحد } u_{10} . \quad (3) \quad S_n = (9n+3) \times \frac{n}{2} \quad \text{أ-} \quad \pi_n = e^{\frac{n}{2}(9n+3)}$$

$$\text{ب-} \quad \ln \pi_n = 465 \text{ لما } n = 10$$

تمرين 22

نعتبر المتتاليتين (u_n) و (v_n) المعرفتين كما يلي :

$$u_1 = 1 \text{ و } u_{n+1} = \frac{u_n + 2v_n}{2} \text{ من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم } n.$$

$$\text{و } v_1 = 12 \text{ و من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم } n :$$

$$v_{n+1} = \frac{u_n + 3v_n}{4} \text{ (1) نضع من أجل كل عدد طبيعي } n \text{ غير معدوم :}$$

(أ) برهن أن المتتالية (k_n) هندسية يطلب تعيين حدها الأول وأساسها. (ب) عبر عن k_n بدلالة n .

(2) برهن أن المتتالية (u_n) متزايدة وأن (v_n) متناقصة.

(3-أ) نضع من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم: $\alpha_n = 3u_n + 8v_n$ برهن أن المتتالية (α_n) ثابتة. (ب) استنتج عبارة u_n و v_n بدلالة n .

- النتائج:

$$(1) \quad k_{n+1} = \frac{1}{12} \times k_n - \frac{1}{12} \text{ فالمتتالية } (k_n) \text{ هندسية أساسها } \frac{1}{12}$$

$$\text{وحدها الأول } k_1 = 11 \text{ . (ب) } k_n = 11 \times \left(\frac{1}{12}\right)^{n-1}$$

$$(2) \quad u_{n+1} - u_n > 0 \text{ ومنه المتتالية } (u_n) \text{ متزايدة}$$

$$\text{و } v_{n+1} - v_n < 0 \text{ ومنه المتتالية } (v_n) \text{ متناقصة.}$$

$$(3) \quad \alpha_{n+1} = \alpha_n \text{ ومنه المتتالية } (\alpha_n) \text{ ثابتة.}$$

$$\text{ب- } v_n = 3 \times \left(\frac{1}{12}\right)^{n-1} + 9 \text{ و } u_n = -8 \times \left(\frac{1}{12}\right)^{n-1} + 9$$

تمرين 23

(I) نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بـ :

$$\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} - 1 = u_n + 2n + 3^n \end{cases} \text{ من أجل كل عدد طبيعي } n$$

(1) احسب المجاميع الآتية:

$$S_1 = 1 + 3 + 5 + \dots + (2n+1), \quad S_2 = 1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^n$$

$$(2) \quad S = S_1 + S_2 \text{ نعتبر المتتالية } (\alpha_n) \text{ المعرفة بـ:}$$

$$\alpha_n = u_{n+1} - u_n$$

احسب: $S = \alpha_0 + \alpha_1 + \dots + \alpha_n$ ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n .

(II) (v_n) متتالية هندسية حدها الأول $v_0 = 1$ وأساسها موجب

$$\text{حيث : } \frac{v_n \times v_{n+2}}{v_{n-1} \times v_{n+1}} = 9$$

(أ) عين أساس المتتالية (v_n) . (ب) عبر عن v_n بدلالة n .

$$\text{ح- احسب المجموع } S_n = v_0 + \frac{v_1}{3^1} + \frac{v_2}{3^2} + \dots + \frac{v_n}{3^n}$$

- النتائج:

$$(I) \quad S_1 = (n+1)^2 \text{ و } S_2 = \frac{3^{n+1} - 1}{2}$$

يطلب تحديد أساسها r وحدها الأول β_0 .
 ج) استنتج مجموعة الأعداد الزوجية الأصغر من 102 .
 د) أحسب $\pi_n = \beta_5 + \beta_6 + \dots + \beta_n$ ثم عين قيمة العدد الطبيعي n لكي يكون $\pi_n = 90$.

- النتائج:

1) أ - نستعمل البرهان بالتراجع.

ب - $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{3}(1 - u_n) > 0$ ومنه (u_n) متزايدة.

2) إذا كان $\alpha = 1$ فإن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{2}{3}$ وحدها الأول $V_0 = -1$.

$$(3) \text{ أ - } S'_n = \frac{9}{5} \times \left[1 - \left(\frac{4}{9} \right)^n \right], S_n = 3 \times \left[\left(\frac{2}{3} \right)^n - 1 \right] + n$$

$$\text{ب - } \beta_n = V_n + 2n + \left(\frac{2}{3} \right)^n = - \left(\frac{2}{3} \right)^n + 2n + \left(\frac{2}{3} \right)^n = 2n$$

و بما أن $\beta_{n+1} - \beta_n = 2$ فالمتتالية (β_n) حسابية أساسها 2 وحدها الأول $\beta_0 = 0$.

ج - مجموع الأعداد الزوجية الأصغر من 102 هو :

$$\pi_n = (n+5)(n-4) \text{ د - } (0+100) \times \frac{51}{2} = 2550$$

حتى يكون $\pi_n = 90$ هي $n = 10$.

$$\text{و } S = S_1 + S_2 = (n+1)^2 + \frac{3^{n+1} - 1}{2}$$

$$(2) \text{ ب - } u_n = n^2 + \frac{3^n - 1}{2} - 1$$

II) أ - أساس المتتالية (v_n) هو $q = 3$ ب - $v_n = 3^n$

$$\text{ج - } S_n = \boxed{n+1}$$

تمرين 24

نعتبر المتتالية العددية (u_n) حيث : $u_0 = 0$ و

$$u_{n+1} = \frac{1}{3}(2u_n + 1)$$

1- أ) برهن أنه مهما يكن العدد الطبيعي n فإن $0 \leq u_n < 1$.

ب) برهن أن (u_n) متزايدة تماما.

2- لتكن المتتالية (v_n) المعرفة بـ $v_n = u_n - \alpha$ من أجل كل عدد طبيعي n حيث $\alpha \in \mathbb{R}$ - عين قيمة α حتى تكون المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول v_0 .

3- فيما يلي نفرض أن $\alpha = 1$. أ) احسب المجاميع الآتية:

$$S'_n = v_0^2 + v_1^2 + \dots + v_{n-1}^2, S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1}$$

ب) نعتبر المتتالية (β_n) المعرفة بـ من أجل كل عدد طبيعي n :

$$\beta_n = v_n + 2n + \left(\frac{2}{3} \right)^n \text{ - بين أن } (\beta_n) \text{ هي متتالية حسابية}$$

تمرين 25

نعتبر المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة كما يلي :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 2n \end{cases} \quad (1) \text{ احسب } u_1 \text{ و } u_2 .$$

(2) أ- أثبت أن : $u_n \geq n$ مهما يكن العدد الطبيعي غير المعدوم n .

ب- استنتج $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$. (3) نضع من أجل كل عدد طبيعي n :

$$v_n = u_n - 4n + 8 . \quad \text{أ- احسب } v_0 \text{ و } v_1 . \quad \text{ب- بين أن } (v_n)$$

متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$. ج - احسب v_n بدلالة n ثم استنتج قيمة u_n بدلالة n .

- النتائج :

$$(1) \quad u_1 = 1 \text{ و } u_2 = \frac{5}{2} . \quad (2) \quad \text{أ- نبرهن بالتراجع .}$$

$$\text{ب- } \lim_{n \rightarrow \infty} (u_n) = +\infty . \quad (3) \quad \text{أ- } v_0 = 10 \text{ و } v_1 = 5 .$$

$$\text{ب - لدينا } v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n \text{ فالمتتالية } (v_n) \text{ هندسية أساسها } \frac{1}{2} .$$

$$\text{ج - } v_n = 10 \left(\frac{1}{2} \right)^n , \quad u_n = 10 \left(\frac{1}{2} \right)^n + 4n - 8$$

تمرين 26

نعتبر المتتاليتين العدديتين (u_n) و (v_n) المعرفتين بما يلي :

$$u_1 = 1 \text{ و } v_1 = 1 \text{ ومن أجل كل عدد طبيعي } n \text{ أكبر أو يساوي } 2 \text{ ب-}$$

$$3u_n - v_{n-1} = \frac{2-n}{n-1} \text{ و } u_n - v_n = -1 + \frac{1}{n} .$$

$$(1) \text{ احسب } u_2 \text{ و } v_2 . \quad (2) \text{ أ- بين أن } (u_n) \text{ متتالية هندسية أساسها } \frac{1}{3}$$

(ب) احسب u_n ثم v_n بدلالة n .

$$(3) \text{ أ- أثبت باستعمال البرهان بالتراجع أن : } u_n \leq \frac{1}{n} \text{ لكل } n \text{ من } \mathbb{N}^*$$

$$(ب) \text{ بين أن : } 1 - \frac{1}{n} \leq v_n \leq 1 \text{ لكل } n \text{ من } \mathbb{N}^*$$

(ج) استنتج أن المتتالية (v_n) متقاربة وحدد نهايتها .

- النتائج :

$$(1) \quad u_2 = \frac{1}{3} , \quad v_2 = \frac{5}{6} . \quad (2) \quad u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n \text{ إذن}$$

$$(u_n) \text{ متتالية هندسية أساسها } \frac{1}{3} . \quad (ب) \quad u_n = \frac{1}{3^{n-1}} \text{ و}$$

$$(3) \quad v_n = \frac{1}{3^{n-1}} + 1 - \frac{1}{n} \quad \text{ج - } \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 1 \text{ إذن } (v_n) \text{ متقاربة .}$$

تمرين 27

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بما يلي : $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد

طبيعي n بالعلاقة التراجعية : $u_{n+1} = \frac{1}{2}(u_n + \alpha)$ حيث α عدد

حقيقي . (1) أحسب u_1, u_2, u_3 .

(2) بين أن لكل عدد n من \mathbb{N}^* :

$$u_n = \frac{1}{2^n} + \alpha \left(\frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^{n-1}} + \dots + \frac{1}{2} \right)$$

(3) نضع لكل n من \mathbb{N} : $v_n = u_n - \alpha$.

(أ) بين أن المتتالية (v_n) متتالية هندسية محدد أساسها وحدها الأول

(ب) أحسب بدلالة n و α المجموع : $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$

(ج) أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

- النتائج :

$$(1) u_1 = \frac{1}{2}(\alpha + 1), u_2 = \frac{1}{4}(3\alpha + 1)$$

(2) نستعمل البرهان بالتراجع أو المجموع

$$s = \left(\frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^{n-1}} + \dots + \frac{1}{2} \right) \quad n \text{ حدا لمتتالية هندسية أساسها}$$

$$\frac{1}{2} \text{ وحدها الأول } \frac{1}{2} .$$

$$(3) v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n \text{ وهذا يعني أن } (v_n) \text{ هندسية أساسها } \frac{1}{2} \text{ وحدها الأول } v_0 = 1 - \alpha$$

تمرين 28

نعتبر المتتالية الهندسية (u_n) غير منتهية وكل حدودها موجبة حيث

$$\text{حدها الأول } u_1 = 3 \text{ و } u_3 + u_5 = \frac{15}{6} \text{ عین أساس هذه المتتالية}$$

(2- أ) أحسب المجموع $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$.

(ب) أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$. نضع $v_n = \ln u_n$

(3- أ) برهن أن المتتالية (v_n) هي متتالية حسابية يطلب تعيين

أساسها . (ب) أحسب المجموع $S'_n = v_1 + v_2 + \dots + v_n$

- النتائج :

$$(1) q = \frac{1}{2} \quad (2- أ) S_n = 6 \left(1 - \frac{1}{2^n} \right) \quad (ب) \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 6$$

(3- أ) $v_{n+1} - v_n = -\ln 2$ إذن (v_n) متتالية حسابية أساسها $-\ln 2$

$$(ب) S'_n = \ln \frac{81}{64}$$

تمرين 29

(u_n) متتالية عددية معرفة على \mathbb{N} بحدها الأول u_0 الموجب تماما ومن أجل كل عدد طبيعي n بالعلاقة التراجعية $u_{n+1} - u_n = 0,05u_n$

1- (أ) أثبت أن (u_n) متتالية هندسية . (ب) أحسب u_n بدلالة n و u_0

2) نضع $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$. أحسب S_n بدلالة n و u_0 ثم عين n حتى يكون $S_n \geq 20u_0$.

3) بلغ عدد سكان بلد 20 مليون نسمة يوم 1 جانفي 1987.

نفرض أن عدد سكان هذا البلد يرتفع كل سنة بنسبة قدرها 5%.

(أ) ما هو عدد سكان هذا البلد يوم 1 جانفي 1990.

(ب) ابتداء من أي سنة سيتجاوز عدد سكان هذا البلد 30 مليون نسمة ؟

- النتائج :

1- (أ) من العلاقة التراجعية نستنتج ما يلي : $u_{n+1} = 1,05u_n$

إذن (u_n) متتالية هندسية أساسها 1,05 . (ب) $u_n = u_0 \times (1,05)^n$

3- (أ) عدد سكان يوم 1 جانفي 1990 هو 23,152 مليون

(ب) ابتداء من سنة 1996 سيتجاوز عدد سكان هذا البلد 30 مليون .

تمرين 30

(v_n) متتالية عددية معرفة بحدها الأول v_0 الموجب تماما

ولكل n من \mathbb{N} بالعلاقة التراجعية : $v_{n+1} = \frac{5v_n + 2}{v_n + 4}$

1) برهن أن من أجل كل عدد طبيعي n فإن : $v_n > 0$

2) عين v_0 حتى تكون (v_n) متتالية ثابتة .

3) نفرض أن $v_0 = 3$ ونضع $u_n = \frac{v_n - 2}{v_n + \alpha}$ حيث α عدد حقيقي

موجب . (أ) عين قيمة α حتى تكون (u_n) متتالية هندسية يطلب تحديد أساسها وحدها الأول u_0 .

(ب) بين أن من أجل كل عدد طبيعي n فإن : $u_n \neq 1$.

(ج) نفرض أن $\alpha = 1$. أحسب u_n بدلالة n ثم استنتج v_n بدلالة n

- النتائج :

1) نستعمل البرهان بالتراجع . 2) تكون (v_n) ثابتة إذا كان $\alpha = 2$

3- (أ) تكون المتتالية (u_n) هندسية إذا كان $\alpha = 1$ ويكون أساسها

$q = \frac{1}{2}$ و حدها الأول $u_0 = \frac{1}{4}$.

(ب) $u_n = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2^n}$ ، $v_n = -1 - \frac{3}{\frac{1}{4} \times \frac{1}{2^n} - 1}$



تمارين مقترحة للحل

تمرين 01

متتالية حسابية متزايدة حيث:

$$\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 14 \\ u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 + u_4^2 = 94 \end{cases}$$

(1) عين u_1, u_2, u_3, u_4 ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n .

(2) احسب: $S_n = u_4 + u_5 + \dots + u_{2007}$.

تمرين 02

a, b, c بهذا الترتيب تشكل 3 حدود متعاقبة لمتتالية حسابية.

$\frac{1}{a}, \frac{2}{b}, \frac{3}{c}$ بهذا الترتيب تشكل 3 حدود متعاقبة لمتتالية هندسية.

- احسب a, b, c علما أن: $a + b + c = 9$.

تمرين 03

(I) متتالية عددية متزايدة حيث: $u_3 = 17$ و $u_7 = 33$

و تحقق: $u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1} = 0$ من أجل كل عدد طبيعي n غير

معدوم. (1) أثبت أن المتتالية (u_n) حسابية يطلب تعيين أساسها.

(2) اكتب عبارة u_n بدلالة n .

(II) متتالية حسابية حدها الأول v_0 و أساسها r .



Scanned by: Mekkaoui Ayoub
Email: ayoubsoft2011@hotmail.fr

S_n هو مجموع n حد الأولى لهذه المتتالية حيث: $S_n = 2n^2 + 3n$
- احسب v_0 و الأساس r . - عين عبارة v_n بدلالة n .

تمرين 04

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ 4u_{n+1} - 2u_n = 9 \end{cases} \quad (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ متتالية عددية معرفة كما يلي :}$$

$$(v_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ متتالية عددية معرفة كما يلي : } v_n = 2u_n - 9$$

(1) احسب u_1, u_2, u_3 ثم v_1, v_2, v_3 (2) برهن أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها . (3) أكتب v_n بدلالة n ثم استنتج u_n بدلالة n . (4) احسب المجاميع الآتية:

$$S_1 = v_0 + v_1 + \dots + v_n, \quad S_2 = v_0^2 + v_1^2 + \dots + v_n^2, \\ S_3 = u_0 + u_1 + \dots + u_n, \quad S_4 = u_0^2 + u_1^2 + \dots + u_n^2.$$

تمرين 05

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ متتالية عددية معرفة بـ } u_n = 4n + 3.$$

(1) بين أن (u_n) متتالية حسابية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول.
(2) هل العددين 2003 و 2426 حدان من هذه المتتالية ؟
(3) ما قيمة و رتبة الحد الذي نبدأ به حتى يكون مجموع 20 حدا متتابعة من هذه المتتالية مساويا لـ 1620 ؟ (4) عين أصغر عدد طبيعي n حتى يكون $u_n > 8003$.

$$(5) \text{ احسب الجداء } P_n = 3^3 \times 3^7 \times 3^{11} \times \dots \times 3^{4n+3}.$$

تمرين 06

$$\begin{cases} v_1 = 20, v_0 = 1 \\ v_{n+2} = 8v_{n+1} - 16v_n \end{cases} \quad (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ المتتالية المعرفة كما يلي:}$$

$$(1) \text{ نضع من أجل كل عدد طبيعي } n : \alpha_n = \frac{v_n}{4^n}.$$

أ- بين أن (α_n) هي متتالية حسابية محدد أساسها و حدها الأول.
ب - احسب α_n ثم v_n بدلالة n .
(2) نعتبر المجموع $S_n = \alpha_0 + \alpha_1 + \dots + \alpha_n$. عين العدد الطبيعي n حتى يكون $S_n = 190$.

تمرين 07

$$(u_n) \text{ متتالية عددية معرفة بـ } u_0 = \alpha \text{ حيث } \alpha \text{ عدد حقيقي}$$

$$\text{والعلاقة التراجعية: } u_{n+1} = \sqrt{7u_n - 10} \text{ من أجل كل عدد طبيعي } n.$$

(1) عين α حتى تكون (u_n) ثابتة. (2) نضع $\alpha = 3$. أ - أثبت أن

$$2 < u_n < 5 \text{ من أجل كل عدد طبيعي } n. \text{ ب - أثبت أن } (u_n)$$

متزايدة تماما . (3) نضع $\alpha = 6$ ، أثبت أن $u_n > 5$ ، من أجل كل عدد

طبيعي n و استنتج تغيرات (u_n) .

تمرين 08

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ المتتالية المعرفة بـ } u_0 = -1 \text{ والعلاقة التراجعية}$$

$$3u_{n+1} = u_n + 8n + 14 \text{ . أ - احسب } u_3, u_2, u_1 \text{ .}$$

ب - لتكن (v_n) المتتالية العددية المعرفة بـ $v_n = u_n + \alpha n + \beta$ من أجل كل عدد طبيعي n حيث α و β عدنان حقيقيان . عين α

و β حتى تكون (v_n) متتالية هندسية ثم عين أساسها و حدها الأول .

ج - أكتب عبارة v_n ثم u_n بدلالة n . (2) احسب المجاميع الآتية :

$$\alpha_n = v_0 + 3v_1 + 3v_2 + \dots + 3^n v_n, S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$$

تمرين 09

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ $u_1 = \alpha$ حيث α عدد حقيقي غير

معدوم والعلاقة التراجعية: $3u_{n+1} = 2u_n + 4$ من أجل كل عدد طبيعي

n (1) عين α حتى تكون (u_n) ثابتة . (2) نضع $\alpha < 4$.

أ - أثبت أنه من أجل كل عدد n غير معدوم فإن $u_n < 4$.

ب - أدرس اتجاه تغيرات (u_n) ، ماذا تستنتج ؟ (3) (v_n) متتالية

عددية معرفة بـ : $v_n = \frac{1}{2}u_n - \beta$ من أجل كل عدد طبيعي n غير

معدوم (β عدد حقيقي) . أ - عين β حتى تكون (v_n) متتالية هندسية ،

عين أساسها . ب - احسب u_n و v_n بدلالة n و α .

نضع $S_n = v_1 + v_2 + \dots + v_n$. عين α حتى تكون $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 9$.

تمرين 10

$(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متتالية عددية معرفة بحدها الأول v_0 و بالعلاقة التراجعية

$$1 \cdot v_{n+1} = \frac{4}{4 - v_n} \text{ حدد قيمة } v_0 \text{ حتى تكون المتتالية } (v_n) \text{ ثابتة .}$$

(2) برهن أنه إذا كان $v_0 < 2$ فإن $v_n < 2$ مهما يكن العدد الطبيعي n

و أن (v_n) متتالية رتيبة . (3) نضع $v_0 = 1$. أ - احسب v_3, v_2, v_1 .

ب - نعتبر المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة بحدها العام $u_n = \frac{1}{v_n - 2}$.

برهن أن (u_n) متتالية حسابية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول .

ج - أكتب u_n ثم v_n بدلالة n . (د) احسب : $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n, \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

تمرين 11

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + \frac{1}{3} \end{cases} \text{ متتالية عددية معرفة كما يلي : } (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

(1) برهن بالتراجع أن $0 \leq u_n < 1$ مهما يكن العدد الطبيعي n ، ثم

استنتج أن (u_n) متزايدة تماما . - لتكن f دالة عددية حيث :

$$f(x) = \frac{2}{3}x + \frac{1}{3} \text{ . عين العدد الحقيقي } \alpha \text{ بحيث } f(\alpha) = \alpha \text{ .}$$

$$(2) (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ متتالية عددية معرفة بـ : } v_n = u_n - \alpha \text{ .}$$

أثبت أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول .

ب- أكتب v_n بدلالة n ثم استنتج u_n بدلالة n .

ج - احسب المجموع : $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ و استنتج

د- احسب : $S'_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ ، $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ ، $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

تمرين 12

(I) متتالية عددية معرفة كما يلي :

$$\begin{cases} v_0 = 2 & ; 0 < \alpha < \frac{1}{2} \\ v_{n+1} = 2\alpha v_n + 3 \end{cases}$$

(1) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن $v_n > 0$.

(II) نعتبر المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة كما يلي :

$$u_n = v_n + \frac{3}{2\alpha - 1}$$

(1) برهن أن (u_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول .

(2) عبر عن u_n بدلالة α و n ثم استنتج عبارة v_n بدلالة α و n .

(3) احسب : $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$.

(4) نفرض أن $\alpha = \frac{1}{4}$ احسب $S_n = v_{10} + v_{11} + \dots + v_{2n}$.

تمرين 13

لتكن المتتالية (u_n) المعرفة كما يلي : $u_0 = -1$ و $u_1 = 2$

و $u_{n+1} = \frac{1}{5}(u_n + 4u_{n-1})$ حيث $n \geq 1$.

(1) احسب u_2 و u_3 . لتكن $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المتتالية العددية المعرفة كمل

يلي : $v_n = u_{n+1} - u_n$. أ- احسب v_0 ، v_1 ، v_2 .

ب- بين أن (v_n) متتالية هندسية ثم عين أساسها و حدها الأول .

ج - احسب v_n بدلالة n . د - نضع $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ من أجل كل عدد طبيعي n ، احسب S_n بدلالة n و استنتج u_n بدلالة n ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

تمرين 14

نعتبر المتتالية العددية (v_n) المعرفة كما يلي :

$$v_{n+1} = \frac{1}{3}v_n + n - 1, v_0 = 1$$

لتكن (u_n) المتتالية المعرفة كما يلي : $u_n = 4v_n - 6n + 15$.

(1) بين أن (u_n) متتالية هندسية . (2) احسب u_0 ثم أكتب عبارة

u_n بدلالة n و استنتج أن $v_n = \frac{19}{4} \times \frac{1}{3^n} + \frac{6n-15}{4}$ من أجل كل

عدد طبيعي n .

- (3) بين أن المتتالية (v_n) يمكن كتابتها على الشكل
 $V_n = \alpha_n + \beta_n$ حيث (α_n) متتالية هندسية و (β_n) متتالية حسابية .
 (4) احسب $S''_n = \beta_0 + \beta_1 + \dots + \beta_n$ ، $S'_n = \alpha_0 + \alpha_1 + \dots + \alpha_n$ و استنتج عبارة $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$.

تمرين 15

لتكن (u_n) متتالية حقيقية معرفة كما يلي: $u_0 = 2$

$$u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n + 6 \quad (1) \text{ أثبت أن المتتالية } (u_n) \text{ متزايدة تماما .}$$

(2) أثبت أن المتتالية (u_n) محدودة من الأعلى بالعدد 8 . (3) استنتج

أن المتتالية (u_n) متقاربة ثم أوجد $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ (4) لتكن $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$

متتالية عددية معرفة كما يلي : $v_n = u_n + \alpha$ حيث $\alpha \in \mathbb{N}$.

أ- عين قيمة α حتى تكون (v_n) متتالية هندسية . ب- احسب v_n

بدلالة n ثم u_n بدلالة n . ج- احسب $S_1 = v_0 + v_1 + \dots + v_{n-1}$

$$S_2 = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} \text{ و}$$

تمرين 16

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة كما يلي: $u_0 = \frac{1}{2}$ ومن

$$u_{n+1} = \frac{u_n^3}{1 + u_n^2} \quad \text{ب} \quad \text{أجل كل عدد طبيعي } n$$

(1) بين أن $u_n \geq 0$ لكل عدد طبيعي n .

(2) بين أن المتتالية (u_n) متناقصة .

(3) برهن أن (u_n) متقاربة .

(4) بين أن $u_{n+1} \leq \frac{1}{2}u_n$ ثم استنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

تمرين 17

$(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متتالية عددية معرفة كما يلي : $v_0 = e^3 - 1$ ومهما يكن

العدد الطبيعي n فإن $e^3 \cdot v_{n+1} = 1 - e^3 + v_n$.

(1) أ- احسب v_1, v_2, v . ب- أثبت أن $1 + v_n > 0$ من أجل كل عدد

طبيعي n . ج- بين أن (v_n) متناقصة تماما .

(2) $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متتالية عددية معرفة كما يلي : $\alpha_n = 2(1 + v_n)$.

أبين أن (α_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها .

ب- احسب α_n بدلالة n . ج- نضع $S_n = \alpha_0 + \alpha_1 + \dots + \alpha_n$

احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ (3) عين n حتى يكون $S_n = 2 \times 10^{-9}$ (يعطى

$$(\log 10 = 2,3)$$

تمرين 18

(1) لتكن المتتالية العددية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة بـ u_0 و العلاقة التراجعية

$$u_{n+1} = 1,05u_n + 1000 \text{ . نعتبر المتتالية } (v_n) \text{ المعرفة بـ :}$$

1. $v_n = u_n + 2000$ - ا- برهن أن المتتالية (v_n) هي متتالية

هندسية يطلب تعيين أساسها . ب- احسب v_n بدلالة v_0 و n و استنتج

u_n بدلالة u_0 و n . ج- احسب المجموع $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

(2) في 1 جانفي 1978 عدد سكان مدينة هو 20000 ساكنا ، كل عام

يزداد عدد سكان هذه المدينة بـ 5% ، ضافة إلى 1000 شخص يأتون

للإقامة بها بصفة نهائية . أ- عين عدد السكان في 1 جانفي 1983 .

ب- عدد التلاميذ في الطور الابتدائي يمثل 20% من عدد السكان ، إذا

خصصنا معلما لكل 40 تلميذا، ما هو عدد المعلمين في 1 جانفي 1983؟

تمرين 19

نعتبر المتتالية العددية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة كما يلي: $u_0 = \frac{1}{2}$ ،

$$1. u_{n+1} = \frac{2u_n}{1+u_n} \text{ احسب } u_1 , u_2 .$$

(2) أ- بين بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن $u_n > 0$.

ب- بين بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن $u_n - 1 < 0$.

(3) بين أن المتتالية (u_n) متزايدة تاما .

$$(4) \text{ لتكن } (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ متتالية عددية معرفة بـ : } v_n = \frac{1-u_n}{u_n} .$$

(1) أ- برهن أن المتتالية (v_n) هي متتالية هندسية يطلب تعيين

أساسها q وحدها الأول v_0 . ب- احسب v_n بدلالة n و استنتج u_n

بدلالة n .

تمرين 20

نعتبر المتتالية العددية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة كما يلي: $u_0 = \frac{1}{4}$ ،

$$1. u_{n+1} = u_n^2 + \frac{1}{2}u_n \text{ احسب } u_1 , u_2 .$$

ب- بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن $0 \leq u_n < \frac{1}{4}$.

(2) بين أن (u_n) متتالية متناقصة.

(3) أ- بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن $u_{n+1} \leq \frac{3}{4}u_n$.

$$\text{ب- استنتج أن: } u_n \leq \left(\frac{3}{4}\right)^n u_0 + \left(\frac{3}{4}\right)^n .$$

(4) حدد نهاية المتتالية (u_n) .

تمرين 21

نعتبر المتتالية العددية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة كما يلي: $u_0 = \frac{1}{2}$ ،

$$1. u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{1}{u_n} \right) \text{ برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد}$$

طبيعي n فإن $u_n > 0$ (2) نضع $v_n = \frac{-1+u_n}{1+u_n}$. أوجد العلاقة

بين v_{n+1} و v_n . استنتج نهاية v_n لما n تؤول إلى $+\infty$ ثم نهاية u_n لما n تؤول إلى $+\infty$ ثم نهاية .

تمرين 22

نعتبر المتتاليتين العدديتين $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ و $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفتين كما يلي:

$$u_1 = 1 \text{ و } v_1 = 1 \text{ و } 3u_n - v_{n-1} = \frac{2-n}{n-1} \text{ و } u_n - v_n = -1 + \frac{1}{n} \text{ من أجل } n \geq 2$$

(1) أ- احسب u_2 و v_2 . ب- بين أن المتتالية (u_n) هندسية أساسها $\frac{1}{3}$. ج- احسب u_n ثم v_n بدلالة n .

(2) أ- أثبت أن $u_n \leq \frac{1}{n}$ من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n

(استعمل البرهان بالتراجع) . ب- بين أن $1 - \frac{1}{n} \leq v_n \leq 1$ من أجل

كل عدد طبيعي غير معدوم n . ج- استنتج أن المتتالية (v_n) متقاربة و حدد نهايتها .

(3) احسب الجداء $P_n = u_1 \times u_2 \times \dots \times u_n$ ثم $\lim_{n \rightarrow +\infty} P_n$.

تمرين 23

لتكن المتتالية العددية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة بحددها الأول u_0 و العلاقة

$$u_{n+1} = \frac{3u_n + 4}{u_n} \text{ التراجعية}$$

(I) نفرض أن $u_0 = 4$ (1) احسب u_1 ، u_2 (2) بين بالتراجع أن (u_n) ثابتة .

(II) نفرض فيما يلي أن $u_0 = 1$ و نضع $v_n = \frac{u_n - 4}{u_n + 1}$ لكل عدد

طبيعي n (1) بين أن (v_n) متتالية هندسية و حدد أساسها .

(2) بين أن (v_n) متقاربة و احسب نهايتها .

(3) احسب $S_n = v_5 + v_6 + \dots + v_{n+5}$.

تمرين 24

نعتبر المتتالية العددية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ معرفة كما يلي :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n - n - \frac{8}{3} \end{cases}$$

(1) نعرف متتالية جديدة (v_n) بـ: $v_n = u_n + \alpha n - 1$ حيث $\alpha \in \mathbb{R}$

و $n \in \mathbb{N}$. أ- أوجد العدد الحقيقي α بحيث تكون (v_n) متتالية هندسية

ب- في هذه الحالة احسب v_n بدلالة n .

(2) نضع $v_n = u_n + 3n - 1$. احسب u_n بدلالة n .

(3) أ- احسب بدلالة n المجموع $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$.

ب- احسب نهاية S_n لما تؤول n إلى $+\infty$.

(4) احسب بدلالة n المجموع $S'_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

تمرين 25

(v_n) متتالية حسابية متناقصة حدها الأول v_0 و أساسها r .

$$(1) \text{ عين } v_2 \text{ و } r \text{ علما أن : } \begin{cases} v_1 + v_2 + v_3 = 24 \\ v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 = 210 \end{cases}$$

(2) أ- استنتج v_n بدلالة n . ب- احسب $v_0 + v_1 + \dots + v_n$.

(3) نعتبر المتتالية (u_n) $_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة كما يلي : $u_n = e^{14-3n}$

أ- بين أن المتتالية (u_n) هندسية يطلب تعيين أساسها . ب- احسب

المجموع $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ و الجداء

$$\pi_n = u_0 \times u_1 \times \dots \times u_n$$

ب- احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ و $\lim_{n \rightarrow +\infty} \pi_n$.

تمرين 26

لتكن المتتالية العددية (u_n) المعرفة كما يلي :

$$u_1 = \alpha \text{ و من أجل كل عدد طبيعي } n \text{ غير معدوم } 3u_{n+1} = 2u_n - 4$$

(1) عين قيمة α حتى تكون المتتالية (u_n) ثابتة .

(2) نفرض أن $\alpha > -4$.

أ) برهن أن من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم فإن : $u_n > -4$

ب) أدرس اتجاه تغيرات المتتالية (u_n).

(3) نفرض في ما يأتي أن $\alpha = 2$

نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم

ب- : $v_n = \frac{1}{2}u_n + 2$. أ) برهن أن المتتالية (v_n) هي متتالية

هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول .

ب) احسب v_n ثم u_n بدلالة n .

ج) احسب المجموع : $S_n = u_4 + u_5 + \dots + u_{n-3}$.

تمرين 27

(u_n) متتالية عددية معرفة بحدها الأول $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد

طبيعي n بالعلاقة التراجعية : $u_{n+1} = \alpha u_n + \beta$ حيث

α و β عددين حقيقيين ($\alpha \neq 0$).

(1) عين α حتى تكون (u_n) حسابية ثم احسب u_n بدلالة n و β

(2) (v_n) متتالية عددية معرفة من أجل كل عدد طبيعي n

ب- : $v_n = u_{n+1} - u_n$. أ) بين أن (v_n) متتالية هندسية ثم احسب S_n

حيث : $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1}$ واستنتج عبارة u_n بدلالة α, β, n

(2) عين قيم α حتى تكون (u_n) متقاربة . (3) نضع $\alpha = \frac{1}{2}$ و $\beta = 1$

- احسب : $\pi_n = u_0 + 2u_1 + 2^2u_2 + \dots + 2^{n-1}u_{n-1}$.

تمرين 28

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة في \mathbb{N} ب- : $u_0 = 2$ و من أجل كل عدد

طبيعي n : $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 2n$. (1) احسب u_1, u_2 .

2- (أ) أثبت أن من أجل كل عدد طبيعي n فإن $u_n \geq n$

(ب) استنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

(3) نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n = u_n - 4n + 8$

(أ) أحسب v_0, v_1 . (ب) بين أن (v_n) متتالية هندسية.

(ج) أحسب v_n بدلالة n . (4) أحسب : $S_1 = v_1 + v_2 + \dots + v_n$

$$S_2 = u_0 + u_1 + \dots + u_n, \quad \pi_n = v_0 \times v_1 \times \dots \times v_n$$

تمرين 29

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة على \mathbb{N} بـ : $u_0 = \frac{1}{4}$ وبالعلاقة

$$u_{n+1} = \frac{3u_n + 2}{u_n + 4} \quad \text{التراجعية :}$$

1- (أ) عين العددين الحقيقيين a, b بحيث من أجل كل عدد طبيعي n :

$$u_{n+1} = a + \frac{b}{u_n + 4} \quad \text{(ب) باستعمال البرهان بالتراجع أثبت أن}$$

من أجل كل عدد طبيعي n : $-2 < u_n < 1$.

(ج) استنتج اتجاه تغيرات المتتالية (u_n) .

(2) لتكن $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المتتالية العددية المعرفة كما يلي : $v_n = \frac{u_n + 2}{1 - u_n}$

(أ) أثبت أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين حدها الأول وأساسها

(ب) عين عبارتي v_n و u_n بدلالة n

تمرين 30

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة كما يلي : $u_0 = 10$ ومن أجل

$$u_{n+1} = \frac{9u_n - 49}{u_n - 5} \quad \text{كل عدد طبيعي } n$$

(1) بين أن من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n \neq 7$.


(2) لتكن المتتالية العددية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ :

$$v_n = \frac{1}{u_n - 7} \quad \text{(أ) بين أن } (v_n) \text{ متتالية حسابية يطلب تعيين أساسها}$$


(ب) أحسب v_n ثم u_n بدلالة n .

(ج) أوجد قيمة n حتى تكون $u_n = \frac{115}{16}$

(3) أحسب : $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$




ثُمَّ رَجَعَ أَخْرَجَ لِي حُدْرِي وَبَسَّرَ لِي أَمْرِي وَاحْلَلَّ عَقْدَةَ مِنْ لِسَانِي
بِمَقَامِي قَوْلِي ۞




بِالتَّوْفِيقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
فِي الْبِكَالُورِيَا

الفهرس



5..... الملخص 

9..... تمارين محلولة 



71..... تمارين مرفقة بالحل 

101..... تمارين مقترحة للحل 

120 الفهرس •

Scanned by: Mekkaoui Ayoub
Email: ayoubsoft2011@hotmail.fr

في نفس السلسلة



ISBN : 978-9947-0-1865-1

Scanned by: Mekkaoui Ayoub
Email: ayoubsoft2011@hotmail.fr